


حلـــــول الكـــامـــل


2025
2026
الفصل الأول


الوحدة
الأولى والثانية

توجـــيهي
صنـــاعي

إعداد: ميّ عمار حوّاري

موقع قطرة التعليمي
Qatraedu.com
+972 59-276-7085





مـقــدمـــــــة

إيماناً منا بضــرورة توفير أفضــل المصــادر التعليمية لطلبتنا في مرحلة الثانوية العامة، يسّــر فريق موقع قطرة التعليمي تقديم الإجابات النموذجية لـ "كراسة الكامل" (تصنيف أسئلة السنوات السابقة).

تأتي هذه الحلول ضمن إطار جهودنا المستمرة في موقع قطرة التعليمي، الذي تأسس برؤية طموحة تهدف إلى تزويد طلاب التوجيهي بتعليم عالي الجودة، لا سيما في مادة الرياضيات، مستخدمين أحدث الأساليب والوسائل التعليمية العالمية.

وقد تم إعداد هذه الكراسة خصيصاً لطلاب الفرع **الصنـــــــاعي**، لتتضمن حلولاً مفصلة وشرحاً وافياً لكل الأسـئلة، انطلاقاً من إيماننا بأن التعلم الرقمي يمنح الطالب مرونة الوصـول إلى المعرفة في أي وقت ومن أي مكان.

وإننـا في موقع قطرة التعليمي، نؤمن بأن وراء كل إنجاز عظيم جنوداً مجهولين؛ لذا نتقدم بأســمى آيات الشــكر والتقدير للمعلّمة الفاضــلة **ميّ عمار حوّاري**، عضــو فريقنا المتميز، التي ســخرت وقتها وجهدها وخبرتها العميقة في إعداد هذه الحلول بدقة وإتقان. إن خبرتها الواســعة تجلت في أســلوب الشــرح المبســط والواضــح الذي يضــع مصــلحة الطالب وتفوقه الأكاديمي في المقام الأول؛ فجزيل الشــكر لها، ونســأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتها.

أتمنى أن تكون هذه الكراســة عونًا لكم في رحلتكم نحو النجاح، وأن تســاهم في تحقيق التفوق والتميز الذي تسعون إليه.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح الدائم.

أ. محمد عزمي القطراوي

مدير موقع قطرة التعليمي

إهـــــداء

إلى صاحبةُ القلبِ الأحنّ،

والأثر الأعمق،

إلى من كان حضورها فرقًا،

وكلماتها أثرًا لا يزول،

من غرست بداخلي حلمًا لا يزال يكبر،

ملهمتي وقدوتي... نجمتي اللامعة،

معلمتي الغالية **رولا بطة**، حفظكِ الله ورعاكِ دائمًا

أ. ميّ عمار حوّاري

روابط مهمة

رابط تحميل كراسة الكامل المرتبطة بهذه الحلول

https://q.qatraedu.com/sinaae-kamel1

لا تفتح هذا الرابط ولا تمسح الباركود بالأسفل

https://q.qatraedu.com/tlqatramath

نصائح مهمة لكيفية دراسة الرياضيات؟

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة، إليك بعض النصائح التي ستساعدك على التفوق في دراستك لهذه المادة وتحقيق أفضل النتائج:

1. **إخلاص النية لله.**
2. **التوكل على الله** بالأخذ بجميع أسباب التفوق، والدعاء والالحاح فيه فهو من أعظم أسلحة المسلم.
3. **فهم الأساسيات أولًا:** تأكد من أنك تفهم الأساسيات بشكل جيد. ولضمان التمكن من الأساسيات فقد وفرنا دورة مجانية عبر موقع قطرة التعليمي.
4. **التدريب المستمر باستخدام الورقة والقلم:** الحل المتكرر هو الطريق إلى الإتقان، حل المسائل بانتظام وبشكل يومي سيعزز من فهمك ويساعدك على استيعاب المفاهيم بشكل أعمق.
5. **افهم المسألة قبل الحل:** لا تتسرع في حل المسألة دون فهم كامل لمتطلباتها، خذ وقتك في قراءة السؤال جيدًا، وفهم المطلوب قبل الشروع في الحل، التسرع قد يؤدي إلى أخطاء غير ضرورية.
6. **حل المسائل بطريقة منظمة:** نظم خطوات الحل بطريقة واضحة ومنهجية، تدوين الخطوات بتسلسل منطقي يساعدك على متابعة الحل والتعرف على أي خطأ قد يحدث بسهولة، هذا الأسلوب يعزز أيضًا من فرصك في الحصول على درجات كاملة.
7. **راجع بانتظام:** خصص وقتًا لمراجعة ما تعلمته بانتظام، ولا تترك الأمور تتراكم حتى اقتراب موعد الامتحانات، المراجعة المستمرة تسهل تذكر المعلومات وتجعلك أكثر استعدادًا للامتحان.
8. **لا تخجل من طلب المساعدة:** إذا واجهت صعوبة في فهم مفهوم معين أو في حل مسألة ما، لا تتردد في طلب المساعدة من معلمك أو زملائك، الحوار والتفاعل مع الآخرين قد يفتح لك آفاقًا جديدة لفهم المادة.
9. **حافظ على هدوئك وثقتك بنفسك:** التوتر قد يؤثر سلبًا على أدائك، حافظ على هدوءك وثقتك بنفسك أثناء الدراسة وفي الامتحانات، تذكر أن النجاح في الرياضيات يعتمد على الاستمرارية والعمل الجاد، وليس على الحفظ فقط.

10. **استعد للامتحانات بالتحضير المبكر:** لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، ابدأ في التحضير للامتحانات قبل وقت كافٍ، وضع خطة دراسية تغطي جميع الوحدات بشكل متوازن، قم بحل أسئلة الامتحانات السابقة المرفقة في هذه الكراسة، وتأكد من مراجعة الحلول بعد الانتهاء.

11. **قم بتحليل الأخطاء:** عند ارتكاب خطأ في حل مسألة، لا تتجاهله. بدلاً من ذلك، عد إليه وحاول فهم سبب الخطأ وكيف يمكنك تجنبه في المستقبل، التعلم من الأخطاء يُعد أحد أفضل الطرق لتطوير مهاراتك الرياضية.

12. **اجعل لك دفتراً خاصاً لتدوين كل ما يتم دراسته واحرص على تدوين الملاحظات المهمة:** أثناء حل المسائل أو مشاهدة الفيديوهات، احرص على تدوين كل شيء لأنه سيكون من الصعب مشاهدة الفيديوهات في يوم واحد مثل يوم الامتحان، وكتابة الملاحظات المهمة تساعدك على تنظيم أفكارك وتذكر النقاط المهمة عند المراجعة لاحقًا.

نتمنى لك التوفيق والنجاح في رحلتك الدراسية، ونتطلع لأن تكون هذه الكراسة عونًا لك في تحقيق أهدافك في مادة الرياضيات. تذكر أن كل مجهود تبذله اليوم سيثمر في المستقبل.

أ. محمد عزمي القطراوي

مدير موقع قطرة التعليمي

الدرس الأول | متوسط التغير

• القسم الأول | اختر الإجابة الصحيحة :

• 2019 دور أول / إذا كان متوسط تغير $f(x)$ في $[-2,1]$ يساوي (-5) وكان $f(2)-3=$ ما قيمة $f(-1)$

د/ -12 ج/ -3 ب/ 8 أ/ 18

الحل / $\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = \frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)} = -5 \Leftarrow f(2)-3 = -15$

$f(-1) = 15+3 \Leftarrow f(-1) = 18$

أ.مي حوّاري

• 2019 دور ثاني / اذا كان $f(x) = \sqrt{4x+1}$ ، ما متوسط تغير $f(x)$ في $[0,2]$

د/ 2 ج/ 1 ب/ -1 أ/ -2

الحل / $\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{f(2)-f(0)}{2-0} = \frac{\sqrt{4\times2+1}-\sqrt{4\times0+1}}{2} = \frac{3-1}{2} - \frac{\sqrt{9}-\sqrt{1}}{2} = 1$

• 2019 دور ثالث / إذا كان $f(x) = \frac{3}{x} + x^2$ ، ما مقدار التغير في $f(x)$ في $[1,3]$

د/ 10 ج/ 6 ب/ 3 أ/ 2

الحل / $\Delta f(x)$ في $[1,3] = f(3)-f(1) = (\frac{3}{3}+3^2)-(\frac{3}{1}+1^2)$

$\Leftarrow \Delta f(x) = 1+9-4 = 10-4 = 6$

• 2020 دور أول / اذا كان $f(x) = x^4+3x$ ، ما متوسط تغير $f(x)$ في $[0,1]$

د/ 9 ج/ 10 ب/ 11 أ/ 36

الحل / $\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{f(1)-f(0)}{1-0} = \frac{(1^4+3\times1)-(0^4+3\times0)}{4} = \frac{(1+3)-(0+0)}{4}$

$= \frac{4-0}{4} = \frac{36}{4} = 9$

• 2020 دور ثاني / اذا كان $f(x) = x^4+2x-1$ وتغيرت x من -1 إلى b وكان متوسط تغير $f(x)$ يساوي 6 ، ما قيمة / قيم الثابت b .

د/ 7 ج/ -160 ب/ 160-1 أ/ 5

الحل / طريقة (1) :

$\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(-1)}{b-(-1)} = 6$

$\Leftarrow \frac{(b^4+2b-1)-(1-2-1)}{(b+1)} = 6$

$\Leftarrow \frac{b^4+2b-1+4}{b+1} = 6 \Leftarrow b^4+2b+1 = 6b+6$

$\Leftarrow \frac{(b+1)(b^3-b^2+b-1)}{(b+1)} = 6 \quad b \neq -1$

$\Leftarrow b^3-b^2+b-1 = 6 \Leftarrow b^3-b^2+b-7 = 0$

$b=2$ نعوض

$8-4+2-7 = 0$ ✓

طريقة (2) :

" تستخدم في ضوء دائرة فقط "

إذا كان $f(x) = ax^3+bx+c$ حيث $a \neq 0$

فإن $\frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$ في $[-b,b] = a(x_1^2+x_2^2)+b$

$\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = a(x_1^2+x_2^2)+b \Leftarrow 6 = a(-1+b)^2+2$

$\Leftarrow 4 = a(-1+b)^2 \Leftarrow 0 = b$

$a=1$ ، $b=2$ ، $x_1=-1$ ، $x_2=b$

• 2021 دور أول/ ما متوسط تغير $ق(س) = س^{-1}$ في $[1,6]$

أ/ $\frac{1}{6}$ ب/ $1-\frac{1}{6}$ ج/ $\frac{1}{6}$ د/ $\frac{1}{6}$

الحل/ $\frac{ق(ب)-ق(أ)}{ب-أ} = \frac{ق(6)-ق(1)}{6-1} = \frac{6^{-1}-1^{-1}}{5} = \frac{\frac{1}{6}-1}{5} = -\frac{1}{6}$

• تذكر: $P^{-ن} = \frac{1}{P^{ن}}$ و $P^{0} = 1$

• 2021 دور ثاني/ ما متوسط تغير $ق(س) = \sqrt{س-1}$ في $[1,10]$

أ/ $\frac{2}{5}$ ب/ $\frac{1}{5}$ ج/ $\frac{1}{10}$ د/ $\frac{1}{10}$

الحل/ $\frac{ق(ب)-ق(أ)}{ب-أ} = \frac{ق(10)-ق(5)}{10-5} = \frac{\sqrt{10}-1-\sqrt{5}-1}{5} = \frac{4-3}{5} = \frac{1}{5}$

• 2022 دور أول/ يتحرك جسم حسب العلاقة $ف(ن) = ن^3 - 8ن + 18$ و ما السرعة المتوسطة للجسم في $[4,5]$

أ/ $3م/ث$ ب/ $1م/ث$ ج/ $-1م/ث$ د/ $-3م/ث$

الحل/ السرعة المتوسطة $= \frac{ف(ب)-ف(أ)}{ب-أ} = \frac{ف(5)-ف(4)}{5-4} = \frac{(125-40+18)-(64-32+18)}{1}$

$= (103)-(50) = 53-50 = 3م/ث$

أ.مي حوّاري

• 2022 دور ثالث/ اذا كان $ق(س) = س^3 + 4س - 5$ ما متوسط تغير $ق(س)$ في $[0,4]$

أ/ -2 ب/ -1 ج/ 1 د/ 3

الحل/ $\frac{ق(ب)-ق(أ)}{ب-أ} = \frac{ق(4)-ق(0)}{4-0} = \frac{(64+16-5)-(0+0-5)}{4} = \frac{(75)-(-5)}{4}$

$= \frac{80}{4} = 20$

• 2023 دور ثالث/ اذا كان $ق(س) = \frac{3}{س} + س^3$ و $س \neq 0$ ما مقدار تغير $ق(س)$ في $[1,3]$

أ/ 2 ب/ 3 ج/ 6 د/ -10

• مكرر (2019 دور ثالث).

• 2025 دور أول/ إذا كان متوسط تغير $ق(س)$ في $[-1,2]$ يساوي (5) وكان متوسط تغير نفس الاقتران في $[2,4]$ يساوي (-3) و ما مقدار التغير في $ق(س)$ في $[-1,4]$

أ/ $\frac{9}{5}$ ب/ $-\frac{9}{5}$ ج/ -9 د/ 9

الحل/ $\frac{ق(ب)-ق(أ)}{ب-أ}$ في $[-1,2] = 5 \Leftarrow \frac{ق(2)-ق(-1)}{2-(-1)} = 5 \Leftarrow ق(2) - ق(-1) = 15$ ... ①

$\frac{ق(ب)-ق(أ)}{ب-أ}$ في $[2,4] = -3 \Leftarrow \frac{ق(4)-ق(2)}{4-2} = -3 \Leftarrow ق(4) - ق(2) = -6$ ... ②

① + ③ / $ه'(٤) - ه'(-١) = ٩ \Leftarrow \int_{-١}^{٤} ه'(س)\,د س = ٩$

• 2024 نابلس/ إذا كان $ل(س) = س\,ه(س)$ وكان متوسط تغير $ل(س)$ في $[-٤، ٢]$ يساوي (١٢)
$ل(٤) = ٦$ فإن $ه(-٢)$ يساوي :


ج/ ٣٩ د/ ٣٣ ب/ -٦٦ أ/ ٩

الحل/ $\frac{ل(٤) - ل(-٢)}{٤ - (-٢)} = ١٢ \Leftarrow \frac{ل(٤) - ل(-٢)}{٦} = \frac{\int_{-٢}^{٤} ه(س)\,د س}{٦} = ٧٢ \Leftarrow ل(-٢) = ٦٦$

$-ل(-٢ه(-٢)) = ٦٦ \Leftarrow ٢ه(-٢) = ٦٦ \Leftarrow ه(-٢) = \frac{٦٦}{٢} = ٣٣$

• خارجي/ اذا كان $ه(س)$ كثير حدود من الدرجة $ن$ وكان متوسط تغيره عند أي فترة دائماً يساوي $٣\sqrt{٢}$ فإن $ن$ تساوي :

ج/ ٣ ب/ ٢ أ/ ١




الحل/ • لو فرضنا $ه(س)$ من الدرجة (صفر) $\Leftarrow ه(س) = ج$ حيث $ج \in ح$

✗ نعلم أن $\frac{د ه(س)}{د س}$ في $[س١، س٢]$ = ميل القاطع في $[س١، س٢]$

لو رسمنا قاطع لـ $ه(س)$ في أي فترة $\Leftarrow$ سيكون القاطع

هو نفسه $ه(س) \Leftarrow \frac{د ه(س)}{د س}$ = ميل القاطع = ٠ (لأنه يوازي محور السينات)




✓ • لو فرضنا $ه(س) = ٢س + ب \neq ٠$ ∴ $ه(س)$ من الدرجة ١،
القاطع في أي فترة هو نفسه $ه(س)$

$\frac{د ه(س)}{د س}$ = ميل القاطع = معامل $س = ٢$ "لأنه خطي"

اذن متوسط التغير في $[س١، س٢] = ٢ \neq ٠$ ∴

$ه(س) = ٣\sqrt{٢}\,س + ب$

"متوسط تغير الاقتران $(٢س + ب)$ دائماً ٢ في $[س١، س٢]$



أ.مي حواري

✗ • لو فرضنا $ه(س)$ درجته ٢ أ

يكون شكل الاقتران منحنى وفي كل فترة $[س١، س٢]$ يمكنه رسم قاطع مختلف عن الآخر

$\frac{د ه(س)}{د س}$ في $[س١، س٢]$ = ميل القاطع = متغير حسب الفترة

• خارجي/ إذا كان $ص = ه^{ن س} + ٤$ وكان $\frac{ص د}{س د} = \frac{ه^{ن} - ١}{٤}$ وكان $س \in [٤، ٤ن]$ وما قيمة $ن$

ج/ ٨ د/ -٢ ب/ ٤ أ/ ١

الحل/ $\frac{ص د}{س د} = \frac{ص_{س=٤ن} - ص_{س=٤}}{٤ن - ٤} = \frac{(ه^{٤ن} + ٤) - (ه^{٤} + ٤)}{٤ن - ٤}$

$\frac{ه^{ن} - ١}{٤} = \frac{(ه^{٤ن} + ٤) - (ه^{٤} + ٤)}{٤ن - ٤}$

$\Leftarrow ه^{ن} - ١ = ه^{٤ن} - ه^{٤} \Leftarrow ه^{ن} - ١ = ه^{٤ن} - ه^{٤}$

$ن = ٨ \quad ٤ن$

اذا تساوت الأساسات فإن الأسس متساوية ⇐ ٢ن = ٨ ⇐ ن = ٣

• خارجي / إذا كان متوسط تغير ه(س) = ٢س٤ + ٥س - ٣P في [P، ٣P] يساوي (-٣) ما قيمة الثابت P

P/ ٣- ب/ ١ ج/ ١- د/ ٣-

طريقة (١) :

$\frac{د ه(س)}{د س} = \frac{ه(٣P) - ه(P)}{٣P - P} = -٣ \Leftarrow \frac{(٣P)^2 + ٥(٣P) - (٢P^4 + ٥P - ٣P)}{-٢P} = -٣$

$\Leftarrow \frac{(٢P^4 + ٢P) - (٢P^4 + ١٥P - ٣P)}{-٢P} = -٣ \Leftarrow \frac{٢P^4 + ٢P - ٢P^4 - ١٥P + ٣P}{-٢P} = -٣$

$\Leftarrow \frac{-١٢P}{-٢P} = -٣$ ماجذاج (الخاصل مشترك) من البسط

$\Leftarrow \frac{-٢P(٧P + ٥)}{-٢P} = -٣ \neq 0 \Leftarrow ٧P + ٥ = -٣ \Leftarrow ٧P = -٨ \Leftarrow P = -١$

طريقة (٢) : نتذكر $\frac{د ه(س)}{د س}$ لـ ه(س) = أ س^ن + ب س + ج ، أ ≠ ٠ = ن أ س^(ن-١) + ب

$P = ٢$ ، $ن = ٥$ ، $س^{٤} = ٣P$ ، $س = P$

$\frac{د ه(س)}{د س} = ٥(س^{٤} + ٣) + ٠ \Leftarrow \frac{-٥}{-٧} = -٣ = ٢(٣P + P) + ٥ \Leftarrow P = -١ \Leftarrow \frac{-٧}{٧} = \frac{-٢٨}{٧}$

• خارجي تفوق / إذا كان مقدار تغير ه(س) = لو(٤^س - ١) - لو(س + ١) للفترة [٦، ٨] يساوي لو $\left(\frac{٣٤٣}{١٢٥}\right)^{ب}$ ما قيمة الثابت ب

P/ $-\frac{١}{٣}$ ب/ $\frac{١}{٣}$ ج/ ٣ د/ ٣-

الحل / ه(س) = لو(٤^س - ١) - لو(س + ١) - لو((س + ١)(س - ١)) - لو(س + ١)

فرق مربعين

$\Leftarrow$ ه(س) = لو(٤^س + ١) + لو(س - ١) - لو(س + ١) $\Leftarrow$ ه(س) = لو(س - ١)

$د ه(س) = ه(٨) - ه(٦) \Leftarrow ب لو\left(\frac{٣٤٣}{١٢٥}\right) = لو(٨ - ١) - لو(٦ - ١)$

$\Leftarrow ب لو\left(\frac{٧^٣}{٥^٣}\right) = لو(٧) - لو(٥) \Leftarrow ب لو\left(\frac{٧}{٥}\right)^٣ = لو\left(\frac{٧}{٥}\right)$

$\Leftarrow ٣ب لو\left(\frac{٧}{٥}\right) = لو\left(\frac{٧}{٥}\right) \Leftarrow ٣ب = ١ \Leftarrow ب = \frac{١}{٣}$

• تذكر:

لو(أ × ب) = لو أ + لو ب

لو أ - لو ب = لو $\left(\frac{أ}{ب}\right)$

لو $أ^{ن}$ = ن لو أ

$\frac{أ^{ن}}{ب^{ن}} = \left(\frac{أ}{ب}\right)^{ن}$

• القسم الثاني | أجب عن الأسئلة الآتية :

• 2019 دور أول / إذا كان د(س) = $\begin{cases} س^٢ + ه(س - ١) & ، س \geq ١ \\ ه(س) & ، س < ١ \end{cases}$ وكان متوسط تغير ه(س) في [ن، ٣٦] يساوي (٣) فما متوسط تغير د(س) في [ن، ٣٦]

الحل / $\frac{د ه(س)}{د س} = \frac{ه(س^{٢}) - ه(س)}{س^{٢} - س} = \frac{ه(٣) - ه(ن)}{٣ - ن} = ٣ \Leftarrow ه(٣) - ه(ن) = ٦$

أ.مي حواري

$\frac{\Delta ه(س)}{\Delta س} = \frac{ه(٣)-ه(٠)}{٣-٠} = \frac{(٣^٢+٥ه(٣-١))-ه(٠)}{٣} = \frac{٩+٥ه(٢)-ه(٠)}{٣} = \frac{٩+٦}{٣} = \frac{١٥}{٣}$

$\Leftarrow \frac{\Delta ه(س)}{\Delta س} = ٥$

• 2019 دور ثالث/ إذا قطع المستقيم ل منحنى الاقتران $ه(س)$ في النقطتين $(P,١)$ ، $(٧,٣)$ وصنع زاوية مع الاتجاه الموجب لمحور السينات قياسها $(\frac{٣\pi}{٤})$ و ما متوسط تغير الاقتران $ه(س) = ٣ه(س) + س^٢ - ١$ في $[١,٣]$

الحل/ $(٣,٧)$ ، $(١,P)$ $\Leftarrow$ $ه(١) = P$ و $ه(٣) = ب$

ظاه $= \frac{\Delta ه(س)}{\Delta س} = \frac{\Delta ص}{\Delta س} \Leftarrow ظا\frac{٣\pi}{٤} = \frac{ب-P}{٣-١} \Leftarrow -١ = \frac{ب-P}{٢} \Leftarrow ب-P = -٢$

$\frac{\Delta ه(س)}{\Delta س} = \frac{ه(٣)-ه(١)}{٣-١} = \frac{(٣ه(٣)+٣^٢-١)-(٣ه(١)+١-١)}{٢} = \frac{(٣ب+٩-١)-(٣P)}{٢}$

$= \frac{٣ب+٨-٣P}{٢} = \frac{٨+٣(ب-P)}{٢} = \frac{٨+٣(-٢)}{٢} = \frac{٨-٦}{٢} = \frac{٢}{٢} = ١$

• 2020 دور أول/ إذا كان متوسط تغير $ه(س)$ في $[١,٣]$ يساوي (٤) و ما متوسط تغير $ه(س) = س^٣ + ٣ه(س)$ في نفس الفترة.

الحل/ $\frac{\Delta ه(س)}{\Delta س} = \frac{ه(٣)-ه(١)}{٣-١} = ٤ \Leftarrow ه(٣)-ه(١) = ٨$

$\frac{\Delta له(س)}{\Delta س} = \frac{له(٣)-له(١)}{٣-١} = \frac{(٣^٣+٣ه(٣))-(١+٣ه(١))}{٢} = \frac{٩+٣ه(٣)-١-٣ه(١)}{٢}$

$= \frac{(٩-١)+٣(ه(٣)-ه(١))}{٢} = \frac{٨+٣(٨)}{٢} = \frac{٨+٢٤}{٢} = \frac{٣٢}{٢} = ١٦$

أ.مي حواري

• 2020 دور ثاني/ إذا كان $ه(س) = س^٣ - ٣$ أوجد متوسط تغير $ه(س)$ عندما $س = ١$ ، $س = ١+د$ حيث $د$ تتغير من

الحل/ $\frac{\Delta ه(س)}{\Delta س} = \frac{ه(س)-ه(١)}{س-١} = \frac{ه(١+د)-ه(١)}{١+د-١}$

$= \frac{(١+د)^٣-٣-(١-٣)}{د} = \frac{(١+د)^٣-٣+٢}{د} = \frac{(١+د)^٣-١}{د}$ ← فرق مربعين

$= \frac{(١+د-١)(١+د+١)}{د} = \frac{د(٢+د)}{د} = ٢+د$ ، $د \neq ٠$

• 2020 دور ثالث/ ليكن $ه(س) = \begin{cases} ٦-س & ، س \leq ٢ \\ س^٢+٣P & ، س > ٢ \end{cases}$ و كان متوسط تغير $ه(س)$ عندما تتغير $س$ من ١ إلى P و $P > ٢$ يساوي (٩) و ما قيمة الثابت P.

الحل/ $\frac{\Delta ق(س)}{\Delta س} = \frac{ق(ب)-ق(أ)}{ب-أ} \Leftarrow 9 = \frac{ق(2)-ق(1)}{2-1} \Leftarrow 9 = \frac{(2^3+2\times2)-(6-1)}{1}$

$\Leftarrow 9 = 12 - 5 + 2$

$\Leftarrow 2^3 - 5 \times 2^2 + 9 \times 2 + 4 = 0$

$\Leftarrow (2-4)(2^2-2-1) = 0$

$\Leftarrow 2 = 4$ أو $2 = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

$\Leftarrow$ مج $= \{4\}$

أ.م. حواري

• 2021 دور أول/ إذا كان $ق(س) = س^3 + ب س - 2$ وكان متوسط تغير $ق(س)$ في $[2,4]$ يساوي (-3) ما قيمة الثابت ب

الحل/ $\frac{\Delta ق(س)}{\Delta س} = \frac{ق(4)-ق(2)}{4-2} = \frac{(4^3+4ب-2)-(2^3+2ب-2)}{2} = -3$

$(14+4ب)-(2+2ب) = -6 \Leftarrow 14+4ب-2-2ب = -6 \Leftarrow 12+2ب = -6 \Leftarrow 2ب = -18 \Leftarrow ب = -9$

• 2021 دور ثاني/ إذا كان $ق(س) = س^3 + \frac{جـ}{س}$ وكان متوسط تغير $ق(س)$ عندما تتغير س من (3) إلى (1) يساوي (2) ما قيمة/ قيم الثابت جـ

الحل/ $\frac{\Delta ق(س)}{\Delta س} = \frac{ق(1)-ق(3)}{1-3} = 2 \Leftarrow (1^3+\frac{جـ}{1}) - (3^3+\frac{جـ}{3}) = -4$

$\Leftarrow 1+جـ-9-\frac{جـ}{3} = -4 \Leftarrow (1-9)+(جـ-\frac{جـ}{3})-4 \Leftarrow \frac{3جـ-جـ}{3} = -4+8-8$

$\Leftarrow \frac{2جـ}{3} = 4 \Leftarrow جـ = \frac{4\times3}{2} \Leftarrow جـ = 6$

• 2022 دور أول/ إذا كان متوسط تغير $ق(س)$ في $[0,1]$ يساوي (10) و ما متوسط تغير الاقتران $ل(س) = (س-3)^2 ق(س)$ في نفس الفترة.

الحل/ $\frac{\Delta ق(س)}{\Delta س} = \frac{ق(0)-ق(1)}{0-1} = 10 \Leftarrow ق(0) - ق(1) = 40$

$\frac{\Delta ل(س)}{\Delta س} = \frac{ل(0)-ل(1)}{0-1} = \frac{(0-3)^2 ق(0) - (1-3)^2 ق(1)}{4} = \frac{4ق(0)-4ق(1)}{4}$

$= \frac{4(ق(0)-ق(1))}{4} = 40$

• 2023 دور أول/ إذا كان مقدار تغير $ق(س) = س^3 + 2هـ(س-1)$ في $[-2,2]$ يساوي (12) و جد متوسط تغير الاقتران هـ(س) في $[-1,1]$

الحل/ $\Delta ق(س) = ق(2) - ق(-2) = 12 \Leftarrow (2^3+2هـ(2-1)) - ((-2)^3+2هـ(-2-1)) = 12$

$\Leftarrow 8+2هـ(1)-2هـ(-1) = 12 \Leftarrow \frac{2}{2}(هـ(1)-هـ(-1)) = \frac{4}{2} \Leftarrow هـ(1) - هـ(-1) = 2$

$$\frac{\Delta هـ(س)}{\Delta س} = \frac{هـ(1) - هـ(-1)}{1-(-1)} = \frac{2}{2} = 1$$

• 2023 دور ثاني/ اذا كان متوسط تغير $ه(س)$ في $[-1, 4]$ يساوي (7) و ضعف متوسط تغير $ه(س) = 3ه(س) + س$ في $[-1, 4]$

الحل/ $\frac{\Delta ه(س)}{\Delta س} = \frac{ه(4) - ه(1)}{4-1} = 7 \Leftarrow ه(4) - ه(1) = 21$

$$\frac{\Delta هـ(س)}{\Delta س} = \frac{هـ(4) - هـ(1)}{3} = \frac{(3ه(4) + 4) - (3ه(1) + 1)}{3} = \frac{3ه(4) - 3ه(1) + 4 - 1}{3}$$

$$= \frac{3(ه(4) - ه(1)) + 3}{3} = \frac{3 \times 21 + 3}{3} = \frac{54+3}{3} = \frac{57}{3} = 19$$

• 2023 دور ثالث/ اذا كان متوسط تغير $ه(س)$ في $[-1, 5]$ يساوي (4) وكان متوسط تغير $ه(س)$ في $[-1, 5]$ يساوي ضعف متوسط تغير $ه(س)$ في $[-1, 3]$ يساوي (3) بينما متوسط تغير $ه(س)$ في $[2, 3]$ يساوي (2)

الحل/

$\frac{\Delta ه(س)}{\Delta س}$ في $[2, 5] = 4 \Leftarrow \frac{ه(5) - ه(2)}{5-2} = 4 \Leftarrow ه(5) - ه(2) = 12$ ـــ (1)

$\frac{\Delta ه(س)}{\Delta س}$ في $[-1, 5] = 3 \Leftarrow \frac{ه(5) - ه(-1)}{5-(-1)} = 3 \Leftarrow ه(5) - ه(-1) = 18$ ـــ (2)

بطرح (1) - (2) $\Leftarrow ه(-1) - ه(2) = -6 \Leftarrow ه(2) - ه(-1) = 6$

$\frac{\Delta ه(س)}{\Delta س}$ في $[-1, 2] = \frac{ه(2) - ه(-1)}{2-(-1)} = \frac{6}{3} = 2$ ✗

أ.مي حواري

• 2024 دور أول/ إذا كان متوسط تغير الاقتران $ه(س)$ في $[1, 3]$ يساوي (4) وضعف متوسط تغير $هـ(س) = س^3 ه(س) - 2س$ في نفس الفترة علماً بأن $هـ(س)$ يحقق (3, 12)

الحل/ $هـ(س)$ يحقق $(3, 12) \Leftarrow هـ(3) = 12$

$\Leftarrow هـ(3) = 3^3 ه(3) - 2 \times 3 = 12 \Leftarrow 9ه(3) - 6 = 12 \Leftarrow 9ه(3) = 18 \Leftarrow ه(3) = 2$

$\frac{\Delta ه(س)}{\Delta س} = \frac{ه(3) - ه(1)}{3-1} = 4 \Leftarrow ه(3) - ه(1) = 8 \Leftarrow 2 - ه(1) = 8 \Leftarrow ه(1) = -6$

$\frac{\Delta هـ(س)}{\Delta س} = \frac{هـ(3) - هـ(1)}{3-1} = \frac{12 - (ه(1) - 2)}{2} = \frac{12 - (-6-2)}{2} = \frac{12+8}{2} = \frac{20}{2} = 10$

• 2025 دور أول/ اذا كان $ه(س) = س^3 + \frac{1}{س}$ و $س \neq 0$ ، ضد التغير في $ه(س)$ علماً بأن $س_1 = 2$ و $\Delta س = 2$

الحل/ $\Delta س = س_2 - س_1 \Leftarrow 2 = س_2 - 2 \Leftarrow 4 = س_2$

$\Delta ه(س) = ه(4) - ه(2) = (4^3 + \frac{1}{4}) - (2^3 + \frac{1}{2}) = 16 + \frac{1}{4} - 8 - \frac{1}{2}$

$= (16 - 8) + (\frac{1}{4} - \frac{1}{2})$

$= 8 + (\frac{1}{4} - \frac{2}{4}) = 8 - \frac{1}{4} = \frac{4 \times 8 - 1}{4} = \frac{31}{4} = 7\frac{3}{4}$

• 2025 دورتان / اذا كان ص(س) = ضتاس - P حاس وكان متوسط تغير ص(س) في [$\frac{\pi}{2}$ ، π] يساوي $\frac{4}{\pi}$ صد قيمة الثابت P

الحل / $\frac{\Delta ص(س)}{\Delta س} = \frac{ص(\pi) - ص(\frac{\pi}{2})}{\pi - \frac{\pi}{2}} = \frac{(ضتا(\pi) - P حا\pi) - (ضتا\frac{\pi}{2} - P حا\frac{\pi}{2})}{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{\pi}$

$\Leftarrow (-1 - P \times 0) - (0 - P) = \frac{4}{\pi} \times \frac{\pi}{2} \Leftarrow -1 - P = 2 \Leftarrow P = -3$

• 2024 نابلس / إذا كان ص(س) = $س^3$ + ب س - 1 وكان متوسط تغير ص(س) في [1 ، 4] يساوي (8) ما قيمة الثابت ب

الحل / $\frac{\Delta ص(س)}{\Delta س} = \frac{ص(4) - ص(1)}{4 - 1} = 8 \Leftarrow (4^3 + 4ب - 1) - (1 + ب - 1) = 24$

$(15 + 4ب) - ب = 24 \Leftarrow (15 + 3ب = 24) \div 3 \Leftarrow 5 + ب = 8 \Leftarrow ب = 3$

• 2025 نابلس / إذا كان متوسط تغير ص(س) في [1 ، 3] = 2 وكان ص(1) = 1 ضد متوسط تغير هـ(س) = $ص^3$(س) في نفس الفترة.

الحل / $\frac{\Delta ص(س)}{\Delta س} = \frac{ص(3) - ص(1)}{3 - 1} = 2 \Leftarrow \frac{ص(3) - 1}{2} = 4 \Leftarrow ص(3) = 5$

$\frac{\Delta هـ(س)}{\Delta س} = \frac{هـ(3) - هـ(1)}{3 - 1} = \frac{ص^3(3) - ص^3(1)}{2} = \frac{5^3 - 1}{2} = \frac{125 - 1}{2} = \frac{124}{2} = 62$

أ.مي حواري

• خارجي / إذا كان ص(س) = $\frac{P}{س - 3}$ + هـ(س) وكان متوسط تغير ص(س) في [-1 ، 2] يساوي (9) وكان مقدار تغير في هـ(س) في [-1 ، 2] يساوي 3 ، ما قيمة الثابت P

الحل / $\Delta هـ(س) = هـ(2) - هـ(-1) = 3$

$\frac{\Delta ص(س)}{\Delta س} = \frac{ص(2) - ص(-1)}{2 - (-1)} = \frac{(\frac{P}{2 - 3} + هـ(2)) - (\frac{P}{-1 - 3} + هـ(-1))}{3} = 9$

$\Leftarrow 27 = (-P + هـ(2)) - (-\frac{P}{4} + هـ(-1)) \Leftarrow 27 = -P + \frac{P}{4} + هـ(2) - هـ(-1)$

$27 = \frac{-3P}{4} + 5(هـ(2) - هـ(-1)) \Leftarrow 27 = \frac{-3P}{4} + 5 \times 3 \Leftarrow \frac{-3P}{4} = 12 \Leftarrow P = -16$

• خارجي / إذا كان ص = (4 - آب) س + ب وكان $\frac{\Delta ص}{\Delta س}$ = آب ، س ∈ [-3 ، 1] ، ما قيمة الثابت ب

الحل / ص(س) = (4 - آب) س + ب

$\frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{ص(3) - ص(-1)}{3 - (-1)} = آب \Leftarrow ((4 - آب) \times 3 + ب) - (-(4 - آب) + ب) = 8ب$

$3(4 - آب) + ب + (4 - آب) - ب = 8ب \Leftarrow 4(4 - آب) = 8ب \Leftarrow 4 - آب = 2ب$

$\frac{4}{8} = \frac{8ب}{8} \Leftarrow ب = \frac{4}{8} \Leftarrow ب = \frac{1}{2}$

• ما قاعدة كثير الحدود من الدرجة الأولى الذي متوسط تغيره في $[س_1، س_2]$ هو ٤ ويمر بـ $(-١، ١)$

الحل / نفرض $ق(س) = أس + ب$ ، $أ \neq ٠$ ، $أ، ب \in ح$

$$\frac{د ق(س)}{د س} = \frac{ق(س_2) - ق(س_1)}{س_2 - س_1} = \frac{(أ س_2 + ب) - (أ س_1 + ب)}{س_2 - س_1} = \frac{أ س_2 + ب - أ س_1 - ب}{س_2 - س_1} = ٤$$

$$\Leftarrow ٤ = \frac{أ(س_2 - س_1)}{(س_2 - س_1)} \quad س_2 \neq س_1 \Leftarrow أ = ٤$$

$ق(س) = ٤س + ب$ يمر بـ $(-١، ١) \Leftarrow ق(-١) = -٤ + ب \Leftarrow ١ = -٤ + ب \Leftarrow ب = ٣$

$\Leftarrow ق(س) = ٤س + ٣$

• خارجي / إذا كان متوسط تغير $ق(س) = ٣س^{ن-٣}$ في الفترة $[١، هـ]$ هو $\frac{هـ^{ن}}{٣٢(هـ^{ن} - ١)}$

ما قيمة الثابت ن .

الحل / $\frac{د ق(س)}{د س} = \frac{ق(هـ) - ق(١)}{هـ - ١} = \frac{هـ^{ن} - ١}{٣٢(هـ^{ن} - ١)}$

$\Leftarrow ٣هـ^{ن-٣} = \frac{هـ^{ن}}{٣٢} \Leftarrow ٣هـ^{ن-٣} \times ٣٢ = هـ^{ن}$

$\Leftarrow ٣هـ^{ن-٣} \times ٣٢ - هـ^{ن} = ٠ \Leftarrow هـ^{ن-٣}(٣٢ - هـ^{٣}) = ٠ \Leftarrow ن - ٣ = ٠ \Leftarrow ن = ٣$

تذكر: $هـ^{ن} = هـ^{م} \times هـ^{ن} \Leftarrow هـ^{ن+م} = هـ^{ن} \times هـ^{م}$ / $لو_هـ هـ = ١$ / $لو_هـ ١ = ٠$

أ.مي حواري

٣٠ م : السؤال رياضيا خاطئ : $(لو_هـ ١)^{ن-٣} = (٠)^{ن-٣}$ يجب أن تكون $ن \neq ٣$

لو كانت ن أقل من ٣ فمثلا $ن = ٢ \Leftarrow (٠)^{-١} = \frac{١}{٠} = \infty$

امتداد ليصبح السؤال صحيح / أن يذكر بالشروط أن $ن < ٣$ وأن يصبح متوسط التغير $\frac{٣٢هـ^{ن}}{هـ - ١}$

عندها تكون $ن = ٧$.

• خارجي / اذا كان $ق(س) = \begin{cases} \frac{١}{س} & ، س \leq ١ \\ ٢ - س & ، س > ١ \end{cases}$ اوجد متوسط تغير $ق(س)$ على $ق(س) = ق(٤) - س ق(س)$

الفترة $[٠، ٢]$

الحل / $\frac{د ق(س)}{د س} = \frac{ق(٢) - ق(٠)}{٢ - ٠} = \frac{(ق(٢) - ٢ق(٢)) - (ق(٠) - ٠ق(٠))}{٢}$

$$= \frac{(ق(٤) - ٢ \times \frac{١}{٢}) - (٢ - ٠)}{٢} = \frac{٢ - ١ - ٠}{٢} = \frac{٣ - \frac{١}{٤}}{٢} = \frac{\frac{١٢}{٤} - \frac{١}{٤}}{٢} = \frac{\frac{١١}{٤}}{٢}$$

$$= \frac{١}{٢} \times \frac{١١}{٤} = \frac{١١}{٨}$$

• خارجي / إذا كان متوسط تغير $ق(س) = هـ^{(س^{٤} + س)} + ب هـ^{(س+١)}$ في الفترة $[-١، ٠]$ يساوي $٣(هـ - ١)$ ، ما قيمة الثابت ب

الحل/ $\frac{د\,ه(س)}{د\,س} = \frac{ه(ب)-ه(أ)}{ب-أ} = \frac{(هـ^{ب+ج} + بهـ^{ب+د} - 2ب) - (هـ^{أ+ج} + بهـ^{أ+د} - 2ب)}{ب-أ} = 3(هـ-1)$

$\Leftarrow هـ^{ب+ج} + بهـ^{ب+د} - 2ب - هـ^{أ+ج} - بهـ^{أ+د} + 2ب = 3(هـ-1)$

$\Leftarrow هـ^{ب+ج} - هـ^{أ+ج} + بهـ^{ب+د} - بهـ^{أ+د} = 3(هـ-1)$

$\Leftarrow هـ^{ج}(هـ^{ب}-هـ^{أ}) + بهـ^{د}(هـ^{ب}-هـ^{أ}) = 3(هـ-1)$

$\Leftarrow (هـ^{ب}-هـ^{أ})(هـ^{ج}+بهـ^{د}) = 3(هـ-1)$

$\Leftarrow 1+بهـ-1-ب = 3(هـ-1) \Leftarrow بهـ-ب = 3(هـ-1) \Leftarrow ب(هـ-1) = 3(هـ-1)$

$\Leftarrow ب = 3$

• خارجي/ ما متوسط تغير $ه(س) = \begin{cases} [س-1] & 0 \le س < 2 \\ |3س+1| & 2 \le س < 6 \end{cases}$ في $[-1, 5]$.

الحل/ $\frac{د\,ه(س)}{د\,س} = \frac{ه(5)-ه(-1)}{5-(-1)} = \frac{|3\times5+1| - [-1]}{5} = \frac{16-1}{5} = \frac{15}{5}$

• خارجي تقوعد/ جد متوسط تغير $ه(س) = ه_{-1}(س) - 5$ للفترة $[3, 7]$ حيث $(ه(س)-2)(ه(س)+2) = \frac{1+3س}{3}$

الحل/ $(ه_{-1}(س)-2)(ه(س)+2) = \frac{1}{3} + \frac{7}{3}س \Leftarrow ه_{-1}(س) - 3 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}س$ (عزفد مدبير)

$\Leftarrow ه_{-1}(س) - 5 = 3س + (\frac{1}{3}-1)$

$\Leftarrow ه(س) = 3س - \frac{5}{3}$

$\frac{د\,ه(س)}{د\,س} = \frac{ه(7)-ه(3)}{7-3} = \frac{(3\times7-\frac{5}{3}) - (3\times3-\frac{5}{3})}{4} = \frac{21-\frac{5}{3}-9+\frac{5}{3}}{4}$

$= \frac{8}{4} = 2$

أ.ميّ حوّاري

قل لي، كيف أواسيك؟

كيف آخذ بيدك حتّى تُكمل الطّريق؟ كيف أخبرك أنّك الأمَل دائمًا، أنّك مهمٌ لأمّتك، أنّا نحتاجك رغم بعدك وذنبك وخطئك، كيف أخبرك أنّي أشعر بك، كأنّي أسمع صوت صمتك! أُطبّب جراح قلبك، أدعو

• تمرين 2 صفحة 70 / أسئلة إضافية

$\frac{1}{3}$ ب) $\frac{1}{4}$ ج) $\frac{1}{12}$ د) $\frac{1}{16}$ هـ) $\frac{1}{64}$

الحل

$\frac{1}{64} = \frac{1}{4^3} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{16}$ ∴ الإجابة هـ

• تمرين 3 صفحة 70 / أسئلة إضافية

$\frac{1}{3}$ ب) $\frac{1}{4}$ ج) $\frac{1}{12}$ د) $\frac{1}{16}$ هـ) $\frac{1}{64}$

الحل

$\frac{1}{64} = \frac{1}{4^3} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{16}$ ∴ الإجابة هـ

• تمرين 4 صفحة 70 / أسئلة إضافية

أ) $\frac{1}{3}$ ب) $\frac{1}{4}$ ج) $\frac{1}{12}$ د) $\frac{1}{16}$ هـ) $\frac{1}{64}$

الحل

$\frac{1}{64} = \frac{1}{4^3} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{16}$ ∴ الإجابة هـ

الدرس الثاني | قواعد الاشتقاق

• القسم الأول | اختر الإجابة الصحيحة :

إذا كان $ص = س^3 - 3س + 6$ ، $س \neq 0$ فإن $\frac{ص}{س}$ تساوي / أسئلة إضافية

أ) $س^2 - 3$ ب) $س^2 + 3$ ج) $3س^2 - 3$ د) $3س^2 + 3$ هـ) $3س^2 - 3س$

الحل

$\frac{ص}{س} = س^2 - 3$ ∴ الإجابة أ

• تمرين 2 صفحة 70 / أسئلة إضافية

إذا كان $ص = 3س^2 + 1$ ، $س \neq 0$ فإن $\frac{ص}{س}$ تساوي

أ) $6س$ ب) $6س + \frac{1}{س}$ ج) $6س + \frac{1}{س^2}$ د) $6س - \frac{1}{س}$ هـ) $6س - \frac{1}{س^2}$

الحل

$\frac{ص}{س} = 6س + \frac{1}{س^2}$ ∴ الإجابة ج

• تمرين 3 صفحة 70 / أسئلة إضافية

إذا كان $ص = 4س^2 - 3$ ، $س \neq 0$ فإن $\frac{ص}{س}$ تساوي

أ) $8س$ ب) $8س - \frac{3}{س}$ ج) $8س + \frac{3}{س}$ د) $4س - \frac{3}{س}$ هـ) $4س + \frac{3}{س}$

الحل

$\frac{ص}{س} = 8س - \frac{3}{س}$ ∴ الإجابة ب

• تمرين 4 صفحة 70 / أسئلة إضافية

إذا كان $ص = 3س^2 - 6س$ ، $س \neq 0$ فإن $\frac{ص}{س}$ تساوي

أ) $3س - 6$ ب) $3س^2 - 6$ ج) $3س^2 - 6س$ د) $6س - 6$ هـ) $6س^2 - 6$

الحل

$\frac{ص}{س} = 3س - 6$ ∴ الإجابة أ

• تمرين 5 صفحة 70 / أسئلة إضافية

إذا كان $ص = س^3 - 3س^2$ ، $س \neq 0$ فإن $\frac{ص}{س}$ تساوي

أ) $3س^2 - 6س$ ب) $3س^2 - 6$ ج) $3س^2 - 3$ د) $3س^2 - 3س$ هـ) $3س^2$

الحل

$\frac{ص}{س} = 3س^2 - 6س$ ∴ الإجابة أ

• تمرين 6 صفحة 70 / أسئلة إضافية

إذا كان $ص = \frac{1}{س^2}$ ، $س \neq 0$ فإن $\frac{ص}{س}$ تساوي

أ) $\frac{-2}{س^3}$ ب) $\frac{-2}{س^2}$ ج) $\frac{-1}{س^3}$ د) $\frac{-1}{س^2}$ هـ) $\frac{-3}{س^3}$

الحل

$\frac{ص}{س} = \frac{-2}{س^3}$ ∴ الإجابة أ

• تمرين 7 صفحة 70 / أسئلة إضافية

إذا كان $ص = \frac{1}{س^3}$ ، $س \neq 0$ فإن $\frac{ص}{س}$ تساوي

أ) $\frac{-3}{س^4}$ ب) $\frac{-3}{س^3}$ ج) $\frac{-2}{س^4}$ د) $\frac{-2}{س^3}$ هـ) $\frac{-4}{س^4}$

الحل

$\frac{ص}{س} = \frac{-3}{س^4}$ ∴ الإجابة أ

• تمرين 8 صفحة 70 / أسئلة إضافية

إذا كان $ص = 3س^2 - 4$ ، $س \neq 0$ فإن $\frac{ص}{س}$ تساوي

أ) $6س$ ب) $6س - \frac{4}{س}$ ج) $6س + \frac{4}{س}$ د) $3س - \frac{4}{س}$ هـ) $3س + \frac{4}{س}$

الحل

$\frac{ص}{س} = 6س + \frac{4}{س}$ ∴ الإجابة ج

• تمرين 9 صفحة 70 / أسئلة إضافية

إذا كان $ص = 3س^2 - 6س$ ، $س \neq 0$ فإن $\frac{ص}{س}$ تساوي

أ) $3س - 6$ ب) $3س^2 - 6$ ج) $3س^2 - 6س$ د) $6س - 6$ هـ) $6س^2 - 6$

الحل

$\frac{ص}{س} = 3س - 6$ ∴ الإجابة أ

• تمرين 10 صفحة 70 / أسئلة إضافية

إذا كان $ص = س^3 - \frac{3}{س}$ ، $س \neq 0$ فإن $\frac{ص}{س}$ تساوي

أ) $3س^2 + \frac{3}{س^2}$ ب) $3س^2 - \frac{3}{س^2}$ ج) $3س^2 + \frac{3}{س}$ د) $3س^2 - \frac{3}{س}$ هـ) $3س^2$

الحل

$\frac{ص}{س} = 3س^2 + \frac{3}{س^2}$ ∴ الإجابة أ

• 2019 دور ثالث / إذا كان $ق(1) = 6$ ، $ل'(1) = -4$ وكان $ل(س) = ه(س) - 5ق(س)$
ما قيمة $ق'(1)$

ب/ ٣ ج/ -٣ د/ -١٠ أ/ ١٠

الحل / $ل(س) = ه(س) - 5ق(س)$

$ل'(س) = ه'(س) - 5ق'(س)$

$ل'(1) = ه'(1) - 5ق'(1)$

$-4 = -6 - 5ق'(1) \Leftarrow -1 = -5ق'(1)$

$\Leftarrow 2 = ق'(1)$

• 2020 دور أول / إذا كان $ه(س) = \begin{cases} 2س^3 + 4 & ، س \neq 2 \\ 6 & ، س = 2 \end{cases}$ ما قيمة $ق'(2)$

ب/ ٦ ج/ ١٢ د/ غير موجودة أ/ ٨

الحل / نبحث في اتصال $ه(س)$ عند $(س = 2)$

$نها_{س \to 2} ه(س) = نها_{س \to 2} (2س^3 + 4) = 2(2)^3 + 4 = 8 + 4 = 12$

$ه(2) = 6 \times 2 = 12$

بما أن $نها_{س \to 2} ه(س) = ه(2) = 12$ إذن $ه(س)$ متصل عند $س = 2$ ، $ق(س) = 2س^2$

$\Leftarrow ق'(2) = 4 \times 2 = 8$

أ.مي حوّاري

• 2020 دور ثاني / إذا كان $ه(س) = \begin{cases} س^3 + 3 & ، س \neq 4 \\ 5 & ، س = 4 \end{cases}$ ما قيمة $ق'(4)$

أ/ ٨ ب/ ١٧ ج/ صفر د/ غير موجودة

الحل / نبحث في اتصال $ه(س)$ عند $(س = 4)$

$نها_{س \to 4} ه(س) = نها_{س \to 4} (س^3 + 3) = 4^3 + 3 = 17 + 3 = 19$

$ه(4) = 5$

$نها_{س \to 4} ه(س) \neq ه(4) \Leftarrow ه(س)$ غير متصل عند $(س = 4) \Leftarrow ق'(4)$ غ م

• 2020 دور ثالث / اذا كان $ه(س) = [2س + 8]$ ما قيمة $ق'(4)$

أ/ ٢ ب/ ٨ ج/ غير موجودة د/ صفر

الحل / • مهم لوضع دائرة /

مشتقة $[\ ]$ عند $س = P$

صفر
" عند النقط الداخلية "
نعوض $(س = P)$ داخل $[\ ]$ اذا كان
ناتج التعويض $\neq$ ص فهي داخلية وتكون متصل عندها

غير موجودة
" عند نقط التحول "
نعوض $(س = P)$ داخل $[\ ]$ إذا كان ناتج
التعويض $=$ ص فهي تحول وغير متصل عندها .

نفرض س = ٤ ⇐ ٢×٤ + ٨و = ٣ + ٨و = ١٥و ∉ ص ⇐ عند (س = ٤) نقطة داخلية
⇐ قد(٤) = ∄

• 2020 دور ثالث / إذا كان ه(س) = { س٣ + ٣س + ١ ، س ≥ ١ ؛ [س] + س٣ ، س < ١ } ما قيمة قد(١)؟

ع/P ن/ ٣ ص/ ∄ ك/ غير معرف

الحل / [س] = { ∄ ، ٤ ≤ س < ١ ؛ ١ ، ١ ≤ س < ٢ } ⇐ س < ١

ه(س) = { س٣ + ٣س + ١ ، س ≥ ١ ؛ ١ + ٣س ، ١ > س > ٢ }

قد(١)+ = ٣(١)٢ = ٣

أ.مي حوّاري

• 2021 دور ثاني / اذا كان ه(س) = { س٣ + ٢ ، ٥ ≥ س ؛ ١٠س ، ٥ < س } ما قيمة قد(٤)

ع/P ن/ ٨ ص/ غير معرف ك/ غير معرف

الحل / س = ٤ ∈]-∞ ، ٥[⇐ قد(٤) = (٣ + س٣)′ = ٣س٢ | س=٤ = ٣×١٦ = ٨

• 2022 دور أول / إذا كان الاقتران ه(س) = س^(٣/٢) ما قيمة قد(٤)

ع/P ن/ ٣/٢ ص/ ٤/٣ ك/ ٣/٨

الحل

الحل / ه(س) = س^(٣/٢) ⇐ قد(س) = ٣/٢ س^(١/٢) = ٣/٢ √س

قد(س) = ٣/٢ × ١/(٢√س) ⇐ قد(٤) = ٣/٤ × ١/٤ = ٣/٨

• 2022 دور ثالث / إذا كان ه(س) × ق(س) = ٤ وكان ه(١) = ٢ ، قد(١) = ٥ ما قيمة ق(١)

ع/P ٥- ب/ ١ ج/ ١٥ ك/ ١٥-

الحل / ه(س) × ق(س) = ٤ ⇐ ق(س) = ٤/ه(س) ⇐ ق′(س) = -٤قد(س)/ه٢(س)

ق(١) = -٤قد(١)/ه٢(١) = -٤×٥/٢٢ = -٥

• 2023 دور ثالث / إذا كان قد(١) = ٦ ، ل(١) = -٤ وكان ل(س) = ه(س) - ٥ق(س) ما قيمة ق′(١)

ع/P ٥- ب/ ٢ ج/ ٣ ك/ ٥

مكرر « سؤال 2019 دور ثالث »

• 2024 دورثاني/ $ق(س) = س^{ن}$ ، $ن \in ص$ وكان $ق^{(3)}(س) = 24 س^{ن-3}$ فإن مقيمة الثابت $ب$

ب/ 20 ج/ 12 د/ $ن-3$

الحل/ $ق(س) = ن س^{ن-1} \Leftarrow ق'(س) = ن(ن-1) س^{ن-2} \Leftarrow ق^{(3)}(س) = ن(ن-1)(ن-2) س^{ن-3}$

بالمقارنة $\Leftarrow ن(ن-1)(ن-2) س^{ن-3} = 24 س^{ن-3}$

$ن(ن-1)(ن-2) = 24 \Leftarrow ن = 5 \Leftarrow ن-3 = 2$

$ب = 10 \Leftarrow 24ب = 240 \Leftarrow 24ب = 3 \times 4 \times 5 \times 2$

• 2024 دورثالث/ إذا كان $ق(س)$ ، $هـ(س)$ قابلين للاشتقاق وكان $هـ(2) = -1$

$ق(2) = هـ(2) = -3$ ما قيمة $(ق - \frac{1}{هـ})'(2)$

ب/ 9 ج/ 6 د/ -3

الحل/ $(ق - \frac{1}{هـ})'(2) = ق'(س) - \frac{-هـ'(س)}{هـ^2(س)}|_{س=2} = ق'(2) + \frac{هـ'(2)}{هـ^2(2)}$

$= -3 + \frac{-3}{(-1)^2} = -3 - 3 = -6$

• 2025 دورثاني/ إذا كان $ص = \frac{ب}{1+س^2}$ ، $ص س^2 - 1$ ما قيمة الثابت $ب$ $= \frac{1}{3}|_{س=2} \frac{ص}{س}$

ب/ $\frac{-1}{3}$ ج/ -3 د/ $\frac{1}{3}$

الحل/ $\frac{ص}{س} \Leftarrow \frac{-ب}{(1+س^2)^2} = \frac{-ب}{(1+2)^2} = \frac{-ب}{9} = \frac{1}{3} \Leftarrow \frac{1}{3} = \frac{-ب}{9}$

$\Leftarrow ب = -3 \Leftarrow -ب = 3$

• 2025 جنين نابلس/ إذا كان $ق(س) = \frac{[\frac{1}{2}س + 1]}{|س - 12|}$ وما قيمة $ق'(3)$

ب/ 2 ج/ -2 د/ -3

الحل/ $[\frac{1}{2}س + 1] = \begin{cases} 1 & ؛ 2 \le س < 2 \\ 2 & ؛ 2 \le س < 4 \end{cases}$ $\Leftarrow س = 3 \in [2,4[$

$|س - 12| = \begin{cases} 12 - س & ؛ 2 \le س < 12 \\ س - 12 & ؛ س \ge 12 \end{cases}$ $\Leftarrow س = 3 \in [2,\infty[$

$\Leftarrow ق(س) = \frac{2}{12 - س}$ $\Leftarrow ق'(س) = \frac{-2}{(12-س)^2}$ $\Leftarrow ق'(3) = \frac{-2}{(12-3)^2} = -\frac{2}{81}$

• خارجي/ إذا كان $ق(س)$ كثير حدود ، ما قيمة $ق(-1)$ إذا علمت أن $ق(س) - (ق + ق')(س) = 4س^3 + 17س + 21$

د/ 21 ج/ 33 ب/ -8 أ/ 8

الحل/ $ق(س) - (ق + ق')(س) = 4س^3 + 17س + 21$

$ق(س) - ق(س) - ق'(س) = 4س^3 + 17س + 21$

$\Leftarrow ق(س) = \frac{2}{2-س}$ $\Leftarrow ق'(س) = \frac{-2}{(س-2)^2}$ $\Leftarrow ق'(3) = \frac{-2}{(3-2)^2} = -2$

أ.ميّ حوّاري

هـ(س) = قـ(س) × قـ(س) من الدرجة الثانية وبما أنه درجة هـ > درجة قـ > درجة قـ

اذن هـ(س) من الدرجة الثانية

نفرض هـ(س) = ٤س² + ٩س + ب

قـ(س) = ٣س + ٩

قـ(س) = ٨

هـ = قـ × قـ = ٤س² + ٩س + ب − ٨

٤س² + ١٢س + ٢١ = ٤س² + (٩ − ٨)س + (ب − ٨) بالمقارنة

ب − ٨ = ٢١ ⇐ ب = ٢١ + ٨ = ٢٩

ب − ٨ = ٢١ / ١٢ − ٩ − ٨

٢٥ = ٩

ب = ٤٥

⇐ هـ(س) = ٤س² + ٢٥س + ٤٥

هـ(−١) = ٤ − ٢٥ + ٤٥ = ٣٣

• خارجي / اذا كان هـ(س) = $\frac{1}{ج}$ سـ^ن وكانت قـ^(٣)(س) = (ج + ٢)(س) ما قيمة الثابت ج الموجبة

ج/٨ ب/٦ أ/٤

الحل / قـ(س) = $\frac{ن}{ج}$ سـ^(ن−١) ⇐ قـ^(٣)(س) = $\frac{1}{ج}$ ن(ن−١)(ن−٢) سـ^(ن−٣)

د/٢

⇐ (ج + ٢)(س) = $\frac{ن(ن-١)(ن-٢)}{ج}$ سـ^(ن−٣) بالمقارنة

أ.مي حوّاري

سـ^١ = سـ^(ن−٣) ⇐ ن − ٣ = ١ ⇐ ن = ٤

(ج + ٢) = $\frac{ن(ن-١)(ن-٢)}{ج}$ ⇐ ج^٢ + ٢ج = ٤ × ٣ × ٢ ⇐ ج^٢ + ٢ج − ٤٢ = ٠

⇐ (ج − ٤)(ج + ٦) = ٠

إما ج + ٦ = ٠ ⇐ ج = −٦ × سالب / أو ج − ٤ = ٠ ⇐ ج = ٤ ✓

• خارجي تفوق / ما قيمة $\frac{ك س}{ك ع}$ (سـ^ن) ($\frac{1}{س+1}$) عندما س = ١

المشتقة الثانية لـ

أ/$\frac{1}{٨}$ ب/٨ جـ − ٨ د/٨

الحل / $\left(\frac{1}{س+1}\right)'$ = $\frac{-1}{(س+1)^{٢}}$ = −(س + ١)^(−٢)

$\left(\frac{1}{س+1}\right)''$ = −١ × −٢(س + ١)^(−٣) = ٢(س + ١)^(−٣) = $\frac{٢}{(س+1)^{٣}}$

المشتقة ← $\frac{ك س}{ك ع}$ = $\left(\frac{٢ \times ٣ س^{٢}}{(س+1)^{٣}}\right)$ $\frac{ك س}{ك ع}$ = $\frac{(س+1)^{٣} \times ٣ س^{٢} - ٢ س^{٣} (س+1)^{٢} \times ٣}{(س+1)^{٦}}$ | س = ١

= $\frac{٢ \times ٣ \times ٢ - ٤ \times ٣^{٣} \times ٢}{٦٤}$ = $\frac{٢٤ - ٣٤}{٦٤}$ = $\frac{-١٠}{٦٤}$ = $\frac{-٥}{٣٢}$

• خارج تفوق/ أي من الاقترانات التالية قابلة للاستمرار عند (س=٠)

P/ ق(س) = |س| ب/ ل(س) = √س^٤ ج/ ه(س) = |س|^٣ ء/ ك(س) = س / (س^٤+س)

الحل ✗ P/ ق(س) = |س| صحابه س=٠ :

ق'(س) = 1/(2√س) ⇐ ق'(٠) = 1/(2√٠) = 1/٠ غير موجودة

✗ ب/ ل(س) = √س^٤ = |س| متصل عند نقطة التحول (س=٠) وغير مشتقة عندها

✗ ك/ ك(س) = س/(س^٤+س) صحابه 2/{أصغر المقام} = 2/{٠، -1}

غير معرف عند (س=٠)

✓ ج/ ه(س) = |س|^٣ = |س^٣| = { س^٣ ; س ≥ ٠ ; -س^٣ ; س < ٠ } متصل لأنه قيمة مطلقة للاقتران متصل

ه'(س) = { ٣س^٣ ; س > ٠ ; -٣س^٣ ; س < ٠ }

ه'(٠)+ = ٠ ، ه'(٠)- = -٣×٠ = ٠ ⇐ ه'(٠) = ٠

• القسم الثاني | أجب عن الأسئلة الآتية :

• 2017 دور أول/ اذا كان ق(س) ، ه(س) اقترانين قابلين للاشتقاق وواقعين في الربع الأول حيث ق(س) - ه(س) = ب، ب عدد ثابت، ه(٢) = ٢، ه'(٢) = -٣، (ق/ه)'(٢) = ٩ جد قيمة الثابت ب

الحل ق(س) - ه(س) = ب ⇐ ق(س) = ب + ه(س)

ق'(س) = ه'(س) ⇐ ق'(٢) = ه'(٢) = -٣

ق(٢) = ب + ه(٢) ⇐ ق(٢) = ب + ٢

(ق/ه)'(٢) = [ه(٢)ق'(٢) - ق(٢)ه'(٢)] / ه^٢(٢) = [٢×-٣ - (ب+٢)×-٣] / ٢^٢ = ٩

⇐ -٦ + ٣ب + ٦ = ٣٦ ⇐ ٣ب = ٣٦ ⇐ ب = ١٢

• 2018 دور أول/ إذا كان ق(س) = س^٣ - ٣س ، ه(س) = ٤/س + ٩ ، س ≠ ٠ جد قيمة الثابت أ حيث (ق×ه)'(١) = ٢٦

الحل ق(س) = س^٣ - ٣س ⇐ ق(١) = ١ - ٣ = -٢

ق'(س) = ٣س^٢ - ٣ ⇐ ق'(١) = ٣ - ٣ = ٠

ه(س) = ٤/س + ٩ ⇐ ه(١) = ٤ + ٩

ه'(س) = -٤/س^٢ ⇐ ه'(١) = -٤

(ق×ه)'(١) = ق(١)ه'(١) + ه(١)ق'(١)

٢٦ = -٢×-٤ + (٤+٩)٠ ⇐ ٢٦ = ٤ + ٤ + ٩ ⇐ ٢٦ - ٨ = ٩ ⇐ ٩ = ١٨

أ.مي حوّاري

• 2020 دور ثاني/ اذا كان الاقتران هـ(س) قابلا للاشتقاق وكان هـ(٢)=٣ ، هـَ(٢)=-١ وكان قـ(س) = $\frac{1}{هـ(س)}$ - هـ(س) أوجد قيمة قـَ(٢)

الحل

قـَ(س) = $\frac{-هـَ(س)}{هـ^2(س)}$ - ١ ← قـَ(٢) = $\frac{-هـَ(٢)}{هـ^2(٢)}$ - ١ = $\frac{-١}{٣^2}$ - ١

قـَ(٢) = $\frac{-٩}{٩}$ + ١ - $\frac{٩}{٩}$ = $\frac{-١٠}{٩}$

• 2021 دور ثاني/ اذا كان قـ(س) = $\begin{cases} ٩س^3 + ١٢ & ؛ س \leq ٢ \\ ٤س^2 + ب س & ؛ س > ٢ \end{cases}$ وكان قـ(س) قابلا للاشتقاق عند س=٢ أوجد قيمة الثابت ٩، ب

الحل/ قـ(٢) موجودة ← قـ(س) متصلا عند (س=٢)

قـ(٢)$^+$ = قـ(٢)$^-$

٩د س^2 = ٢س + ب | س=٢

٩د(٢^2) = ٢×٢ + ب

٩×١٢ = ٤ + ب

٩١٢ - ب = ٤ ـــ (١)

نهـا$_{س \to ٢^+}$ (٤س^2 + ب س) = نهـا$_{س \to ٢^-}$ ٩س^3 + ١٢

٤د + ٢ب = ٩د + ١٢

٤ - ٢ب = ٩د - ١٢

[٤ - ٢ب = ٩د - ١٢] ÷ ٢

-٤ = ب - ٤د ـــ (٢)

بطرح (١) - (٢) ← ٩١٢ - ٤ = ٩د - ٤ ← ٩د = ٨ ← د = ١ نعوضها في (٢)

٤ - ٤د = ب ← ٤ - ٤ = ب ← ب = ٠ ← ب = ٠

• 2023 دور أول/ اذا كان قـ(س) = س هـ(س) + هـ(٤) ، قـَ(٤) = ٦ حاصل قـَ(٤)

الحل/ * قـَ(س) = س هـَ(س) + هـ(س)

قـَ(٤) = ٤هـَ(٤) + هـ(٤) ← ٦ = ٢هـ(٤) + هـ(٤) ← ٦ = ٣هـ(٤) ← ٢ = هـ(٤)

* قـَ(س) = س هـَ(س) + هـ(س)

قـَ(س) = س قـَ(س) + هـ(س) × $\frac{٢س}{١}$

قـَ(٤) = ٤قـَ(٤) + $\frac{هـ(٤)}{٤}$ = ٢(٦) + $\frac{٢}{٤}$ = ١٢ + $\frac{١}{٢}$ = ١٢,٥

• 2023 دور أول/ اذا كان قـ(س) = $\begin{cases} ٩س & ؛ س \leq ١ \\ ب س^3 + س + ١ & ؛ س > ١ \end{cases}$ وكان قـ(س) قابلا للاشتقاق على ح

أوجد قيمة الثابت ٩، ب

الحل/ قـ(س) مشتقة على ح ← قـ(س) مشتقة عند (س=١)

قـ(١) موجودة ← قـ(س) متصل عند (س=١)

قـ(١)$^+$ = قـ(١)$^-$

نهـا$_{س \to ١^+}$ (ب س^3 + س + ١) = نهـا$_{س \to ١^-}$ ٩س

ب + ١ + ١ = ٩

٢ + ب = ٩ ـــ (٢)

٣ب س^2 + ١ | س=١ = ٩

٣ب + ١ = ٩

٣ب = ٨

ب = $\frac{٨}{٣}$

٢ + $\frac{٨}{٣}$ = ٩

$\frac{١٤}{٣}$ = ٩ ـــ (١)

نفرضها في ② $ب=1 \Leftarrow ب-ب=2-1 \Leftarrow 2ب+ب=1+2ب \Leftarrow ② = ①$

$ب=3 \Leftarrow 1+2=ب \Leftarrow 2+ب=ب$

• 2023 دور ثالث / اذا كان $ق(س)=\begin{cases} [س-2]+س^2 & ، \ س<2 \\ \frac{2}{س+1} & ، \ 2 \le س<3 \end{cases}$ ابحث في قابلية الاشتقاق على مجاله

الحل / $[س-2]$

$ل=\frac{1}{1-1}=1$

$[س-2]=\begin{cases} 2-س & ، \ س<1 \\ 1 & ، \ 1 \le س<2 \\ 0 & ، \ 2 \le س<3 \\ س-3 & ، \ س \ge 3 \end{cases}$

$ق(س)=\begin{cases} 2+س^2 & ، \ س<ب \\ 1+س^2 & ، \ ب \le س<1 \\ س^2 & ، \ 1 \le س<2 \\ \frac{2}{س+1} & ، \ 2 \le س<3 \end{cases}$

مجاله $س \in]-\infty ، ب[$.

أ.مي حواري

• الفتران المفتوحة :

• عندما $س \in]ب ، 1[$ فإن $ق(س)=2+س^2$ متصل وقابل للاشتقاق على $ح$.

• عندما $س \in]1 ، 2[$ فإن $ق(س)=س^2$ متصل وقابل للاشتقاق على $ح$

• عندما $س \in]2 ، 3[$ فإن $ق(س)=\frac{2}{س+1}$ متصل لأنه نسبي والمقام $\neq 0 \Leftarrow ق(س)=\frac{-2}{(س+1)^2}$

• النقط الطرفية :

عند $س=ب$ فإن $ق(ب)$ غير طرفية .

• نقاط التحول :

* $س=1$ نبحث في الاتصال

$\lim_{س \to 1^+} = 1$ ، $\lim_{س \to 1^-} س^2 = 1$ ، $ق(1)=1+1=2 \Leftarrow$ غير متصل عند $س=1 \Leftarrow ق(1)$ غير قابل للاشتقاق

* عند $(س=2)$

$\lim_{س \to 2^+} = \frac{2}{1+س} = \frac{2}{1+2} = \frac{2}{3}$ ، $\lim_{س \to 2^-} س^2 = 2^2 = 4 \Leftarrow$ غير متصل عند $س=2 \Leftarrow ق(2)$ غير قابل للاشتقاق

$\Leftarrow ق(س)=\begin{cases} 2+س^2 & ، \ ب<س<1 \\ س^2 & ، \ 1<س<2 \\ \frac{2}{س+1} & ، \ 2<س<3 \\ س-3 & ، \ س>3 \end{cases}$ غير قابل للاشتقاق $س \in \{1 ، 2 ، 3\}$.

• 2024 دور أول/ إذا كان $ق(س)=\begin{cases} أ س^2+ب س & ، س \le 3 \\ -س^3+ب س+12 & ، س>3 \end{cases}$ وكان $ق(س)$ قابل للاشتقاق على الفترة $]-\infty,\infty[$ ، أجد قيمة الثابتين أ ، ب

الحل/ $ق(س)$ قابل للاشتقاق على $]-\infty,\infty[$ $\Rightarrow$ $ق(س)$ متصل عند $(س=3)$

$ق(3)$ موجودة ← $ق(س)$ متصل عند $(س=3)$

$ق(3)^+ = ق(3)^-$

$-3س^2+ب = 2أ س+3$ | $س=3$

$-3(3)^2+ب = 2أ(3)+3$

$ب-27 = 6أ+3$

$ب = 6أ+30$ ـــ (1)

$نها_{س\to3^+} (-س^3+ب س+12) = نها_{س\to3^-} (أ س^2+3س)$

$-27+3ب+12 = 9أ+9$

$3ب = 9أ+24$

$ب = 3أ+8$ ـــ (2)

بطرح (2) − (1) $\Rightarrow$ $0 = 3أ-2$ نعوضها في (1) $\Rightarrow$ $ب = 6+4 = 10$

$أ = \frac{2}{3}$ $\Rightarrow$ $ب = 2+8 = 10$

• 2024 نابلس/ إذا كان $ق(س)=\begin{cases} أ س^2+2 & ، س<2 \\ س^3+ب س+ج & ، س \ge 2 \end{cases}$ وكان $ق(س)$ قابل للاشتقاق عند $(س=2)$ ما قيمة كل من الثابتين أ ، ب

الحل/ $ق(2)$ موجودة ← $ق(س)$ متصل عند $(س=2)$

$ق(2)^+ = ق(2)^-$

$3س^2+ب = 2أ س$ | $س=2$

$12+ب = 4أ$

$ب = 4أ-12$ ـــ (1)

$نها_{س\to2^+} (أ س^2+2) = نها_{س\to2^-} (س^3+ب س)$

$4أ+2 = 8+2ب$

$4أ-2ب = -6$ ـــ (2)

(1) في (2) / $4أ-2(4أ-12) = -6$ $\Rightarrow$ $ب = 4(2)-12 = -4$

$-4أ+24 = -6$ $\Rightarrow$ $-4أ = -30$ $\Rightarrow$ $أ = \frac{15}{2}$

أ.مي حوّاري

• خارجي/ إذا كان $ق(س)=\begin{cases} س^3 & ، س \le 1 \\ أ س^2+ب س+ج & ، س>1 \end{cases}$ وكانت $ق(1)$ ، $ق'(1)$ موجودة

ما قيمة كل من الثوابت أ ، ب ، ج

الحل/ $ق(1)$ موجودة ← $ق'(1)$ موجودة ← $ق(س)$ متصل عند $(س=1)$

$ق(1)^+ = ق(1)^-$

$2أ+ب = 3$ | $س=1$

$2أ+3 = 3$

$2أ = 0$

$أ = 0$

$ق'(1)^+ = ق'(1)^-$

$2أ+ب = 3س^2$ | $س=1$

$2(0)+ب = 3$

$ب = 3$

$نها_{س\to1^+} (أ س^2+ب س+ج) = نها_{س\to1^-} (س^3)$

$أ+ب+ج = 1$

$0+3+ج = 1$

$ج = -2$

الدرس الثالث | مشتقات الاقترانات المثلثية

• القسم الأول | اختر الإجابة الصحيحة :

• 2017 دور أول / إذا كان ص = جاس ظتاس جد $\frac{د ص}{د س}$

أ/ جتاس　　ب/ جتاس قتاس　　ج/ جاس　　د/ - جاس

الحل/ ص = جاس × ظتاس ⇐ ص = جاس × $\frac{\text{جتاس}}{\text{جتاس}}$ ⇐ ص = جتاس ⇐ $\frac{د ص}{د س}$ = - جاس

• 2019 دور ثاني / إذا كان ص = ظاس ما قيمة $\frac{د ص}{د س}$

أ/ ١ - ص^{٢}　　ب/ - ١ - ص　　ج/ ١ + ص^{٢}　　د/ ١ + ص

الحل/ ص = ظاس ⇐ $\frac{د ص}{د س}$ = قا^{٢}س = ظا^{٢}س + ١ = ص^{٢} + ١
(متطابقة)

• 2019 دور ثالث / إذا كان ق(س) = ظاس ما قيمة ق$'$($\frac{\pi}{٤}$)

أ/ ١　　ب/ ٢　　ج/ ٣　　د/ ٤

الحل/ ق$'$(س) = ٢ ظاس × قا^{٢}س　　"سلسلة"

ق$'$($\frac{\pi}{٤}$) = ٢ ظا($\frac{\pi}{٤}$) × قا^{٢}($\frac{\pi}{٤}$) = ٢ × ١ × ٢ = ٢ × ١ × $\frac{١}{(\frac{١}{\sqrt{٢}})^{٢}}$ = ٢ × ١ × $\frac{١}{\frac{١}{٢}}$ = ٢ × ٢ = ٤

• 2022 دور أول / اذا كان ص = $\frac{س}{\text{جا}(٢س)}$ ما قيمة $\frac{د ص}{د س}$ عند س = $\frac{\pi}{٤}$

أ/ صفر　　ب/ ١　　ج/ ٥٠

الحل/ ص = $\frac{س}{\text{جا}(٢س)}$ ⇐ $\frac{د ص}{د س}$ = $\frac{\text{جا}(٢س) \times ١ - س \times \text{جتا}(٢س) \times ٢}{\text{جا}^{٢}(٢س)}$ | عند س = $\frac{\pi}{٤}$

$\frac{د ص}{د س}$ = $\frac{\text{جا}(\frac{\pi}{٢}) - ٢ \times \frac{\pi}{٤} \times \text{جتا}(\frac{\pi}{٢})}{\text{جا}^{٢}(\frac{\pi}{٢})}$ = $\frac{١}{١^{٢}}$ = ١

• 2022 دور ثاني / اذا كان ق(س) = قا^{٢}س + ٣ ما قيمة ق$'$(س)

أ/ قا^{٢}س ظاس　　ب/ ظا^{٢}س　　ج/ ٢ قا^{٢}س ظاس　　د/ ٢ قاس ظاس

الحل/ ق$'$(س) = ٢ قاس × قاس ظاس　　"سلسلة"

= ٢ قا^{٢}س ظاس .

أ.مي حواري

• 2022 دور ثالث / إذا كان ص = ظتاس + قتاس ما قيمة $\frac{ص}{ص}$

أ/ قتاس　　ب/ - قتاس　　ج/ $\frac{-١}{\text{ظتاس}}$　　د/ - ظتاس

الحل/ ص = - قا^{٢}س - قتاس ظتاس "نخرج - قتاس عامل مشترك"

ص = - قتاس (قتاس + ظتاس)

$\frac{ص}{ص}$ = - قتاس × $\frac{ص}{ص}$ ⇐ $\frac{ص}{ص}$ = - قتاس

• 2023 دور ثاني / إذا كان ق(س) = جتا(٢س) ما قيمة ق$'$(س) + ٦ق(س)

أ/ جا٢س　　ب/ جا(٢س)　　ج/ ٢ جتا(٢س)　　د/ ٢ جا(٢س)

الحل/ $ق_د(س) = ح_{ب}(٢س) \leftarrow ق_د(س) = -ح_{ب}(٢س) \Leftarrow ق(س) = -٤ ص_{ب}(٢س)$
$ق(س) + ٦ق_د(س) = -٤ ص_{ب}(٢س) + ٦ص_{ب}(٢س) = ٢ص_{ب}(٢س)$

• 2023 دورثاني/ إذاكان $ص = ق_{أس} + ظ_{أس}$ ماقيمة $\frac{ص}{س}$

P/ $ص_{ق أس}$ ن/ $ص_{ق أس}$ ج/ $-ص_{ظ أس}$ د/ $ص_{جأس}$

الحل $ص_{ق} = -ق_{أس} ظ_{أس} - ق_{أس}$ باخراج $(-ق_{أس})$ كعامل مشترك

$ص_{ق} = -ق_{أس}(ق_{أس} + ظ_{أس})$

$ص_{ق} = -ق_{أس}$ ص

أ.مي حواري

• 2024 دورثاني/ إذاكان $ق_د(س) = ح_{ب}(٢س)$ ماقيمة $ق_د(س) + ٦ق_د(س) =$

P/ $٣ح_{ب}(٢س)$ ن/ $-ح_{ب}(٢س)$ ج/ $٣ص_{ب}(٢س)$ د/ $-٣ص_{ب}(٢س)$

الحل $ق_د(س) = ٣ص_{ب}(٢س) \leftarrow ق_د(س) = -٤ح_{ب}(٢س)$

$ق_د(س) + ٣ق_د(س) = -٤ح_{ب}(٢س) + ٣ح_{ب}(٢س) = -ح_{ب}(٢س)$

• خارجي/ إذاكان $ص = ق_{أس} + ظ_{أس}$ ماقيمة $\frac{ص}{س}$

P/ $ق_{أس} \times ص$ ن/ $ق_{أس}$ ج/ $ص_{ب}(س) \times ص$ د/ $ق_{أ}(س)$ ص

الحل $ص_{ق} = ق_{أس} ظ_{أس} + ق_{أس}$ "باخراج $ق_{أس}$ كعامل مشترك"

$ص_{ق} = ق_{أس}(ظ_{أس} + ق_{أس})$

$ص_{ق} = ق_{أ}(س)$ ص

• خارجي/ إذاكان $ق_د(س) = ح_{ب}(٢س)$ ماقيمة $ق_د(س) + ٦ق_د(س)$

P/ $-١٠ح_{ب}(٢س)$ ن/ $١٠ح_{ب}(٢س)$ ج/ $٤ح_{ب}(٢س)$ د/ $٢ح_{ب}(٢س)$

الحل $ق_د(س) = ٢ص_{ب}(٢س) \leftarrow ق_د(س) = -٤ح_{ب}(٢س)$

$ق_د(س) + ٦ق_د(س) = -٤ح_{ب}(٢س) + ٦ح_{ب}(٢س) = ٢ح_{ب}(٢س)$

• 2020 دورثالث/ إذاكان $ص = \frac{ح_{أس}}{١ - ج_{أس}}$ أثبت أن $\frac{د ص}{د س} = \frac{١}{١ - ج_{أس}}$

الحل

$ص_{ق} = \frac{(١ - ج_{أس})(-ج_{أس}) - ص_{ب}(-ح_{أس})}{(١ - ج_{أس})^{٢}} = \frac{-ج_{أس} + ح^{٢}_{أس} + ص^{٢}_{ب}}{(١ - ج_{أس})^{٢}} = \frac{-ج_{أس} + ١}{(١ - ج_{أس})^{٢}}$

$ص_{ق} = \frac{(١ - ج_{أس})}{(١ - ج_{أس})(١ - ج_{أس})} = \frac{١}{١ - ج_{أس}}$ #

• 2021 دورأول/ اذا كان $ق_د(س) = P ج_{أس}$ و $ق(س) = ق_{أس} ظ_{أس}$ ماقيمة الثابت P عندما

$(ق \times ص)_{ق}(\frac{\pi}{٤}) = ٨$

الحل $ق_د(س) = P ج_{أس} \leftarrow ق_د(\frac{\pi}{٤}) = P ج_{ب}\frac{\pi}{٤} = P \times \frac{١}{\sqrt{٢}} = \frac{P}{\sqrt{٢}}$

$ق_{ق}(س) = P ح_{أس} \leftarrow ق_{ق}(\frac{\pi}{٤}) = P ص_{ب}\frac{\pi}{٤} = P \times \frac{١}{\sqrt{٢}} = \frac{P}{\sqrt{٢}}$

$\frac{1}{(\frac{1}{2})} = 1 \times \frac{1}{\text{ضتا}(\frac{\pi}{4})} = \text{قا}(\frac{\pi}{4}) \times \text{ظا}(\frac{\pi}{4}) = \text{ق}(\frac{\pi}{4}) \Leftarrow \text{ق}(س) = \text{قا}س \cdot \text{ظا}س = 2$

$\text{ق}(س) = \text{جتا}س \times \text{قا}س + \text{ظا}س \times \text{قا}س \text{ظا}س$

$\text{ق}(\frac{\pi}{4}) = \text{جتا}(\frac{\pi}{4}) + \text{قا}^3(\frac{\pi}{4}) \text{ظا}(\frac{\pi}{4}) = (\sqrt{2})^3 + 2\sqrt{2} \times 1 = 4\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$

$\text{ق}(1)_{ص} = 2\sqrt{2} + 8 = 8\sqrt{3}$

$\text{ق}(\frac{\pi}{3}) = \text{جا}(\frac{\pi}{3}) \text{ق}(\frac{\pi}{3}) + \text{جتا}(\frac{\pi}{3}) \text{ق}'(\frac{\pi}{3})$

$(\text{ف} \times \text{ه})'(\frac{\pi}{3}) = \text{ف}'(\frac{\pi}{3}) \text{ه}(\frac{\pi}{3}) + \text{ف}(\frac{\pi}{3}) \text{ه}'(\frac{\pi}{3})$

$1 = (\frac{12}{\sqrt{3}} \times 8\sqrt{3}) + (8 \times \frac{12}{\sqrt{3}}) \Leftarrow 8\sqrt{3}\text{ق}(\frac{\pi}{3}) + 8\text{ق}'(\frac{\pi}{3}) = 1$

$\Leftarrow 24\text{ق}(\frac{\pi}{3}) + 8\text{ق}'(\frac{\pi}{3}) = 8 \Leftarrow 3\text{ق}(\frac{\pi}{3}) + \text{ق}'(\frac{\pi}{3}) = 1 \Leftarrow \text{ق}'(\frac{\pi}{3}) = -2$

- 2022 دور أول/ إذا كان $\text{ق}(س) = \text{جاس}(1 + \text{ضتاس})$ و $س \in]0, \frac{\pi}{2}[$ فاثبت أن $\text{ق}'(س) = 0$

الحل/ $\text{ق}(س) = \text{جاس} \times \text{جاس} - \text{جاس} + (1 + \text{ضتاس})\text{جتاس}$

$= -\text{جا}^2س + \text{جتاس} + \text{جتا}^2س$

$= -(1 - \text{جتا}^2س) + \text{جتاس} + \text{جتا}^2س$

$= -1 + \text{جتا}^2س + \text{جتاس} + \text{جتا}^2س \Leftarrow 0 = 2\text{جتا}^2س + \text{جتاس} - 1$

$\Leftarrow 0 = (2\text{جتاس} - 1)(\text{جتاس} + 1)$

إما $2\text{جتاس} - 1 = 0 \Leftarrow \text{جتاس} = \frac{1}{2} \Leftarrow س = \frac{\pi}{3} \in]0, \frac{\pi}{2}[$

أو $\text{جتاس} + 1 = 0 \Leftarrow \text{جتاس} = -1 \Leftarrow س = \pi \notin]0, \frac{\pi}{2}[$

$\Leftarrow س = \{\frac{\pi}{3}\}$

- خارجي/ إذا كان $\text{ق}(س) = (\text{جا}(2س) + \text{جتا}(2س))(\text{ظاس} \cdot \text{ظتاس})(3س + 2)$ فما قيمة $\text{ق}'(\frac{\pi}{4})$

الحل/ $\text{ق}(س) = (\text{جا}(2س) + \text{جتا}(2س)) \times (\text{ظاس} \times \frac{1}{\text{ظاس}})(3س + 2)$

$\text{ق}(س) = 1 \times 1 \times (3س + 2) = 3س + 2$

$\text{ق}(س) = 3 \Leftarrow \text{ق}'(\frac{\pi}{4}) = 3$

- خارجي/ إذا كان $\text{ق}(س) = \frac{9}{3 - \text{ظاس}} + \text{ظا}(6\pi)$ و $س \in]0, \frac{\pi}{4}[$ فما قيمة $\text{ق}'(\frac{\pi}{4})$.

الحل/ $\text{ق}(س) = \frac{-9 \times -6\text{قاس}}{(3 - \text{ظاس})^2} \Leftarrow \text{ق}'(\frac{\pi}{4}) = \frac{6\text{قا}^2(\frac{\pi}{4})}{(3 - \text{ظا}\frac{\pi}{4})^2} = \frac{6 \times (\sqrt{2})^2}{(3 - 1)^2}$

$= \frac{6 \times 2}{4} = 3$

أ.ميّ حوّاري

نحن مشاريع آخرة، وإنمّا الدّنيا عُبور..

الدرس الرابع | قاعدة لوبيتال و مشتقة الاقتران الأسي واللوغاريتمي

• القسم الأول | اختر الإجابة الصحيحة :

• 2017 دور أول / جـ $\lim_{س \to ٠} \frac{١ - حتاس}{س^٢}$

١/ص ، $-\frac{١}{٢}$/ب ، ١/ح ، ٢/s

الحل / $\lim_{س \to ٠} \frac{١ - حتاس}{س^٢} = \lim_{س \to ٠} \frac{١ - حتا(٠)}{٠} = \frac{١-١}{٠} = \frac{٠}{٠}$

باستخدام لوبيتال / $\lim_{س \to ٠} \frac{جاس}{٢س} = \frac{جا(٠)}{٢ \times ٠} = \frac{٠}{٠}$

لوبيتال مرة ثانية / $\lim_{س \to ٠} \frac{حتاس}{٢} = \frac{حتا(٠)}{٢} = \frac{١}{٢}$

أ.مي حوّاري

• 2017 دور أول / جـ $\lim_{س \to ٠} \frac{١ - حتا(٢س)}{س^٢}$

٤-/ب ، ٣/ب ، ٤/ح ، 1/s

الحل / $\lim_{س \to ٠} \frac{١ - حتا(٢س)}{س^٢} = \frac{١ - حتا(٠)}{٠} = \frac{١-١}{٠} = \frac{٠}{٠}$

باستخدام لوبيتال / $\lim_{س \to ٠} \frac{٢جا(٢س)}{٢س} = \frac{جا(٠)}{٠} = \frac{٠}{٠}$

لوبيتال مرة ثانية / $\lim_{س \to ٠} \frac{٢حتا(٢س)}{١} = ٢حتا(٠) = ٢ \times ١ = ٢$

• 2018 دور أول / إذا كان $قـ'(٥) = ٤$ ، $قـ(٥) = -٨$ جـ $\lim_{س \to ٠} \frac{قـ(٥+٢هـ) - قـ(٥)}{هـ}$

١٦-/ب ، ٨-/ب ، ٤/ح ، 8/s

الحل / $\lim_{هـ \to ٠} \frac{قـ(٥+٢هـ) - قـ(٥)}{هـ} = \frac{قـ(٥) - قـ(٥)}{٠} = \frac{٠}{٠}$

باستخدام لوبيتال / $\lim_{س \to ٠} ٢ \times قـ'(٥+٢هـ) = ٢قـ'(٥) = ٢ \times ٤ = ٨$

• 2019 دور أول / ما قيمة $\lim_{س \to ٠} \frac{س + ظاس}{جاس}$

٢/ب ، ١/ب ، ٥/٥ح ، ∞/s

الحل / $\lim_{س \to ٠} \frac{س + ظاس}{جاس} = \frac{٠ + ظا(٠)}{جا(٠)} = \frac{٠}{٠}$

باستخدام لوبيتال / $\lim_{س \to ٠} \frac{١ + قا^٢س}{حتاس} = \frac{١ + قا^٢(٠)}{حتا(٠)} = \frac{١+١}{١} = \frac{٢}{١} = ٢$

• 2019 دور أول / إذا كان ص = لو٦ س ما قيمة $\frac{دص}{دس}$ عندما س = ٢

١٢/ب ، ١/ب ، ٥/٥ح ، ٣/s

الحل / $ص = ٦ لو_هـ س \Rightarrow \frac{دص}{دس} = ٦ \times \frac{١}{س} \Big|_{س=٢} = ٦ \times \frac{١}{٢} = ٣$

• 2019 دورثاني / إذا كان $ق(س) = س لو_هـ س + ٣$ ما قيمة $ق'(١)$

ب/ ١ ج/ ٥٫٥ د/ ٣

٢/P

الحل / $ق'(س) = س \times \frac{١}{س} + لو_هـ س \Rightarrow ق'(١) = ١ + لو_هـ ١ = ١ + صفر = ١$

• 2020 دورأول / ما قيمة $نهـا_{س \to ٠} \frac{هـ^{س} - س - ١}{س^{٢}}$

ب/ -١ ج/ ٥٫٥ د/ -٥٫٥

٢/P

الحل / $نهـا_{س \to ٠} \frac{هـ^{س} - س - ١}{س^{٢}} = \frac{هـ^{٠} - ٠ - ١}{٠} = \frac{١ - ١}{٠} = \frac{٠}{٠}$

باستخدام لوبتال / $نهـا_{س \to ٠} \frac{هـ^{س} - ١}{٢س} = \frac{هـ^{٠} - ١}{٢ \times ٠} = \frac{١ - ١}{٠} = \frac{٠}{٠}$

لوبتال مرة ثانية / $نهـا_{س \to ٠} \frac{هـ^{س}}{٢} = \frac{هـ^{٠}}{٢} = \frac{١}{٢} = ٠٫٥$

أ.مي حوّاري

• 2020 دورأول / لتكن $ص = س^{٤} لو_هـ ٣س + ٢$ ما قيمة $\frac{دص}{دس}\Big|_{س=هـ}$

ب/ $\frac{هـ}{٣}$ ج/ ٣هـ د/ $\frac{هـ}{٣}$

الحل /

$$\frac{دص}{دس} = (س^{٤} \times \frac{١}{س}) + (لو_هـ ٣س)(٤س^{٣})$$

$$\frac{دص}{دس}\Big|_{س=هـ} = هـ^{٣} + ٤هـ^{٣} لو_هـ هـ = هـ^{٣} + ٤هـ^{٣} = ٥هـ^{٣}$$

• 2020 دورثاني / ما قيمة $نهـا_{س \to ٢} \frac{س^{٥} - ٣٢}{س^{٤} - ١٦}$

ب/ ٤٠ ج/ ٢٠ د/ ٤

٨٠/P

الحل /

$$نهـا_{س \to ٢} \frac{س^{٥} - ٣٢}{س^{٤} - ١٦} = \frac{٢^{٥} - ٣٢}{٢^{٤} - ١٦} = \frac{٠}{٠}$$

باستخدام لوبتال / $نهـا_{س \to ٢} \frac{٥س^{٤}}{٤س^{٣}} = \frac{٥}{٤} \times \frac{٢^{٤}}{٢^{٣}} = \frac{٥}{٤} \times ٢ = ٢٠$

• 2020 دورثاني / اذا كان $ق(س) = س^{٤} - ١٥هـ^{س}$ ما قيمة $ق'(٠)$

ب/ -١٣ ج/ هـ د/ ١٧هـ

٢/P

الحل / $ق'(س) = ٤س^{٣} - ١٥هـ^{س} \Rightarrow ق'(س) = ٤ - ١٥هـ^{٠}$

$ق'(٠) = ٤ - ١٥هـ^{٠} = ٤ - ١٥ = -١٣$

• 2020 دورثالث/ إذا كان ص = لو$_هـ$ (قاس + ظاس) فما قيمة $\frac{دص}{دس}$

أ/ ظاس ب/ قاس ج/ ظاس د/ قاس

الحل/

$ص' = \frac{قاس ظاس + قاس}{(قاس + ظاس)} = \frac{قاس(ظاس + قاس)}{(قاس + ظاس)} = قاس$

• 2022 دورثاني/ ما قيمة $نها_{س \to 1} \frac{تا^{\frac{\pi}{2}}(\pi س)}{1 - س}$

أ/ $\frac{3}{\pi}$ ب/ $\frac{\pi}{2}$ ج/ $\frac{2}{\pi}$ د/ $-\frac{\pi}{2}$

الحل/

$نها_{س \to 1} \frac{تا^{\frac{\pi}{2}}(\pi س)}{1 - س} = \frac{تا^{\frac{\pi}{2}}(\pi)}{1 - 1} = \frac{1}{0}$

باستخدام لوبتال/ $نها_{س \to 1} \frac{\frac{\pi}{2} تا^{\frac{\pi}{2}}(\pi س)}{-1} = \frac{\pi}{2} تا^{\frac{\pi}{2}}(\pi) = \frac{\pi}{2} \times 1 = \frac{\pi}{2}$

• 2022 دورثالث/ ما قيمة $نها_{س \to 0} \frac{هـ^{س} - جتاس}{جاس + س}$

أ/ $\frac{3}{2}$ ب/ 1 ج/ $\frac{1}{2}$ د/ صفر

الحل/

$نها_{س \to 0} \frac{هـ^{س} - جتاس}{جاس + س} = \frac{هـ^{0} - جتا(0)}{جا(0) + 0} = \frac{1 - 1}{0 + 0} = \frac{0}{0}$

باستخدام لوبتال/ $نها_{س \to 0} \frac{هـ^{س} + جاس}{جتاس + 1} = \frac{هـ^{0} + جا(0)}{جتا(0) + 1} = \frac{1 + 0}{1 + 1} = \frac{1}{2}$

• 2023 دورأول/ ما قيمة $نها_{س \to 0} \frac{جتا(س) - 1}{س^{2}}$

أ/ 1- ب/ $\frac{1}{2}$ ج/ 1 د/ $-\frac{1}{2}$

الحل/

$نها_{س \to 0} \frac{جتا(س) - 1}{س^{2}} = \frac{جتا(0) - 1}{0} = \frac{1 - 1}{0} = \frac{0}{0}$

باستخدام لوبتال/ $نها_{س \to 0} \frac{-جاس}{2س} = \frac{-جا(0)}{2 \times 0} = \frac{0}{0}$

لوبتال مرة ثانية/ $نها_{س \to 0} \frac{-جتا(س)}{2} = \frac{-جتا(0)}{2} = -\frac{1}{2}$

• 2023 دورأول/ لتكن ص = لو$_{هـ}$ ظتا فما قيمة $\left| \frac{دص}{دس} \right|_{س = \frac{\pi}{4}}$

أ/ 3 ب/ 4 ج/ 16 د/ 12

أ.ميّ حوّاري

الحل/ $ص = ٨ لو_{هـ} س \Leftarrow \frac{ص}{س} = \frac{٨}{س}$ $\quad س=٢ \Leftarrow \frac{٨}{٢} = ٤$

• 2023 دورثاني/ ما قيمة $\lim_{س \to ٠} \frac{هـ^{٤س} - لو_{هـ}(س+هـ)}{جاس}$

ب/ $\frac{١}{هـ} + ٤$ $\quad$ ج/ $٤ - هـ$ $\quad$ د/ $٤ + هـ$ $\quad$ أ/ $\frac{١}{هـ} - ٤$

الحل/ $\lim_{س \to ٠} \frac{هـ^{٤س} - لو_{هـ}(س+هـ)}{جاس} = \frac{هـ^{٠} - لو_{هـ}(٠+هـ)}{جا٠} = \frac{١-١}{٠} = \frac{٠}{٠}$

باستخدام لوبيتال/ $\lim_{س \to ٠} \frac{٤هـ^{٤س} - \frac{١}{س+هـ}}{ضا(س)} = \frac{٤هـ^{٠} - \frac{١}{٠+هـ}}{ضا٠} = \frac{٤ \times ١ - \frac{١}{هـ}}{١}$

$= ٤ - \frac{١}{هـ}$

• 2024 دورأول/ إذا كان $ق(س) = هـ^{س} + س^{٢} - ٧$ ما قيمة/ قيم س التي تجعل $ق(س) = ق(س)$

أ/ ± ٣ $\quad$ ب/ ٩ $\quad$ ج/ $\pm \sqrt{٩}$

الحل/ $ق(س) = هـ^{س} + ٣س \Leftarrow ق(س) = هـ^{س} + ٢$

$ق(س) = ق(س) \Leftarrow هـ^{س} + ٢ = هـ^{س} + س^{٢} - ٧ \Leftarrow ٢ = س^{٢} - ٧ \Leftarrow ٩ = س^{٢}$

$\pm \sqrt{٩} = \sqrt{س^{٢}} \Leftarrow \pm ٣ = س$

أ.مي حوّاري

• 2024 دورثالث/ إذا كان $ه(س)$ اقتران متصلاً وقابلاً للاشتقاق وكان $ق(١) = ٢$

$\lim_{س \to ١} \frac{ه(س) - ٣س}{س - ١} = ٣$ ما قيمة $أ$

أ/ -١ $\quad$ ب/ ١ $\quad$ ج/ ٢ $\quad$ د/ ٥

الحل/ $\lim_{س \to ١} \frac{ه(س) - ٣س}{س - ١} = \frac{ه(١) - ٣}{١ - ١} = \frac{ه(١) - ٣}{٠}$

بما أن النهاية موجودة والمقام = ٠ $\Leftarrow$ البسط = ٠ $\Leftarrow ه(١) - ٣ = ٠ \Leftarrow ه(١) = ٣$

باستخدام لوبيتال/ $\lim_{س \to ١} ق(س) - أ = ق(١) - أ = ٣ \Leftarrow ٢ - أ = ٣ \Leftarrow ٣ = ٢ - أ$

$\Leftarrow أ = -١$

• 2025 دورأول/ ما قيمة $\lim_{س \to ٠} \frac{هـ^{جاس} - ١}{لو_{هـ}(س+١)}$

أ/ ١ $\quad$ ب/ $هـ$ $\quad$ ج/ $هـ+١$ $\quad$ د/ $هـ-١$

الحل/ $\lim_{س \to ٠} \frac{هـ^{جاس} - ١}{لو_{هـ}(س+١)} = \frac{هـ^{جا٠} - ١}{لو_{هـ}١} = \frac{هـ^{ص} - ١}{ص} = \frac{١-١}{ص} = \frac{ص}{ص}$

باستخدام لوبيتال/ $\lim_{س \to ٠} \frac{هـ^{جاس} \times ضا س}{\frac{١}{س+١}} = \frac{هـ^{جا ص} \times ضا ص}{\frac{١}{ص+١}} = هـ \times ١ \times ١ = ١$

• 2025 دور أول / إذا كان $ص = س^{س^{لو_{هـ} س}}$ وكان $ص_{هـ} = ص$ ما قيمة الثابت $ب$

$\frac{1}{e}$ د/ $\frac{-1}{e}$ ج/ ب/ 1 $1-$ أ/

الحل/ $ص = س^{س^{لو_{هـ} س}} \Leftarrow ص_{هـ} = هـ^{هـ^{لو_{هـ} هـ}} = هـ^{هـ} \neq ب$ ∴

$ص = س^{س^{لو_{هـ} س}} \Leftarrow لو_{هـ} ص = س^{لو_{هـ} س} \times لو_{هـ} س$

$\frac{ص_{س}}{ص} = \frac{س^{لو_{هـ} س}}{س} \times لو_{هـ} س + س^{لو_{هـ} س} \times \frac{1}{س}$

$ص_{س} = ص \times \frac{س^{لو_{هـ} س}}{س} \times لو_{هـ} س + ص \times \frac{س^{لو_{هـ} س}}{س}$

$ص_{س}|_{س=هـ} = هـ^{هـ} \times \frac{هـ^{لو_{هـ} هـ}}{هـ} \times لو_{هـ} هـ + هـ^{هـ} \times \frac{هـ^{لو_{هـ} هـ}}{هـ}$

$= هـ^{هـ} \times \frac{هـ}{هـ} \times 1 + هـ^{هـ} \times \frac{هـ}{هـ} = 1 + 1 = 2$

أ.مي حواري

• 2025 دور أول / إذا كان $ق(س) = هـ^{س^3} + لو_{هـ}(س^3 + 2)$ ما قيمة $ق'(1)$

4 أ/ -4 ب/ $\frac{1}{4}$ ج/ د/ ث

الحل/ $ق'(س) = 3س^2 هـ^{س^3} + \frac{3س^2}{س^3 + 2} \Leftarrow ق'(1) = 3هـ + \frac{3}{3} = 3 + 1 = 4$

• 2025 دور ثاني / ما قيمة $\lim_{س \to 1} \frac{س - \sqrt{س}}{1 - \sqrt{س}}$

$1-$ أ/ 1 ب/ $\frac{-1}{2}$ ج/ $\frac{1}{2}$ د/

الحل/ $\lim_{س \to 1} \frac{س - \sqrt{س}}{1 - \sqrt{س}} = \frac{1-1}{1-1} = \frac{0}{0}$

باستخدام لوبيتال / $\lim_{س \to 1} \frac{1 - \frac{1}{2\sqrt{س}}}{\frac{1}{2\sqrt{س}}} = \frac{1 - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$

• 2025 ضنون نابلس / إذا كان $ق(س) = ب س^2 + 3س$ و ما قيمة الثابت $ب$ حيث

$\lim_{س \to 2} \frac{س^3 - 4س}{ق(2) - ق(س)} = 8$

0.5 أ/ صفر ب/ $0.5-$ ج/ د/ 1

الحل/ $\lim_{س \to 2} \frac{س^3 - 4س}{ق(2) - ق(س)} = \frac{8 - 8}{2ب - 4ب} = \frac{0}{-2ب} = \frac{0}{ث}$

باستخدام لوبيتال / $\lim_{س \to 2} \frac{3س^2 - 4}{-ق'(س)} = \frac{12 - 4}{-ق'(2)} = 8$

$ق'(2) = -1$

$ق(س) = ب س^3 + س \Leftarrow ق'(س) = 3ب س^2 + 1 \Leftarrow ق'(2) = 12ب + 1 = -1 \Leftarrow 12ب = -2$

$ب = \frac{-2}{4} = \frac{-1}{2}$

• شمال الطيل 2025 / إذا كان $ق(س) = ظا(\pi س)$ و ما قيمة $\lim_{هـ \to 0} \frac{ق(\frac{1}{2}+هـ) - ق(\frac{1}{2})}{هـ}$

ب/ ٢ ج/ ن د/ غير موجودة

ب/ ٣-

الحل / $ق(س) = ظا(\pi س) \times 2$

$$\lim_{هـ \to 0} \frac{ق(\frac{1}{2}+هـ) - ق(\frac{1}{2})}{هـ} = \frac{ق(\frac{1}{2}) - ق(\frac{1}{2})}{0} = \frac{ن}{ن}$$

باستخدام لهبتال / $\lim_{هـ \to 0} ق(\frac{1}{2}+هـ) = ق(\frac{1}{2}) = 2ظا(\frac{\pi}{2}) = \frac{2}{ظا^2(\frac{\pi}{2})} = \frac{2}{1} = 2$

• خارجي / إذا كان $ق(س) = هـ^{جاس} + لو_هـ(س+1) - جا(\pi)$ ما قيمة $ق(0) ق(0)$

ب/ هـ د/ 1+هـ د/ 1

الحل / صفر

$ق(س) = هـ^{جاس} + 2لو_هـ(س+1) - 0$

$ق(0) = هـ^{جا(0)} + 2لو_هـ(1) = هـ^{2\times0} + 0 = 1$

$ق(س) = هـ^{جاس} \times جتاس + 2 \times \frac{2س}{س^2+1} \Leftarrow ق(0) = هـ^{جا(0)} جتا(0) + \frac{0\times4}{1}$

$\Leftarrow ق(0) = هـ^{0\times1} + 0 = 1\times1 = 1$

$ق(0) ق(0) = 1\times1 = 1$

أ.ميّ حوّاري

• خارجي / إذا كان $ق(س) = هـ^{لو_هـ(س^2+ج)} - هـ^{2س-6}$ فإن $ق(3)$

ب/ 7 ج/ 0 د/ 4

ب/ 8

الحل / $ق(س) = س^2 + ج - هـ^{2س-6}$

$ق(س) = 2س - هـ^{2س-6} \times 2$

$ق(3) = 2\times3 - 2هـ^{2\times3-6} = 6 - 2هـ^{0} = 6-2 = 4$

• خارجي / إذا كان $ق(س)$ اقتران كثير حدود وكانت $\lim_{س \to 1} \frac{ق(س)-1}{س-1} = 6$ ما قيمة $\lim_{هـ \to 1} \frac{ق(س)-س}{لو_هـ س}$

ب/ 7 ج/ 6 د/ 0

ب/ صفر

الحل / $\lim_{س \to 1} \frac{ق(س)-1}{س-1} = \frac{ق(1)-1}{1-1} = \frac{ق(1)-1}{0} = \frac{0}{0}$

بما أن المقام = 0 والنهاية موجودة ⇐ البسط = 0 ⇐ $ق(1)-1 = 0 \Leftarrow ق(1) = 1$

باستخدام لهبتال / $\lim_{س \to 1} ق(س) = ق(1) = 6$

المطلوب / $\lim_{س \to 1} \frac{ق(س)-س}{لو_هـ س} = \frac{ق(1)-1}{لو_هـ 1} = \frac{1-1}{0} = \frac{0}{0}$

باستخدام لوبيتال / $\lim_{س\to 1} \frac{ق(س)-1}{س-1} = \frac{ق(1)-1}{1} = 6-1=5$

• القسم الثاني | أجب عن الأسئلة الآتية :

• 2019 دورثالث / ما قيمة $\lim_{س\to ٠} \frac{س-جاس}{س^٣}$

الحل / $\lim_{س\to ٠} \frac{س-جاس}{س^٣} = \frac{٠-حا(٠)}{٠} = \frac{٠}{٠}$

باستخدام لوبيتال / $\lim_{س\to ٠} \frac{١-جتاس}{٣س^٢} = \frac{١-جتا(٠)}{٠\times ٢} = \frac{١-١}{٠} = \frac{٠}{٠}$

باستخدام لوبيتال / $\lim_{س\to ٠} \frac{-حاس}{٢} = \frac{حا(٠)}{٢} = \frac{١}{٢}$

أ.ميّ حوّاري

• 2020 دورأول / أوجد $\frac{ك}{كس}(هـ^{س^٣} \times لو_هـ س^٢)$ ، $س > ٠$

الحل /

$\frac{ك}{كس}(هـ^{س^٣} \times ٢لو_هـ س) = هـ^{س^٣} \times \frac{٢}{س} + (٢لو_هـ س) \times هـ^{س^٣} \times ٣س^٢$ اضرب $هـ^{س^٣}$ عامل مشترك

$= هـ^{س^٣}(\frac{٢}{س^٢} + ٣س^٢ لو_هـ س^٢)$

• 2020 دورأول / اذا كان $ص = (١+٣س)هـ^{٣س}$ أثبت أن $ص'' - ٦ص' + ٩ص = ٠$

الحل / $ص' = (١+٣س)هـ^{٣س} \times ٣ + هـ^{٣س} \times ٣$ " اضرب $هـ^{٣س}$ عامل مشترك "

$ص' = هـ^{٣س}(٣(١+٣س)+٣) = هـ^{٣س}(٦+٩س+٣)$

$\Leftarrow ص' = هـ^{٣س}(٩+٩س)$

$ص'' = هـ^{٣س} \times ٩ + (٩+٩س)هـ^{٣س} \times ٣$ " اضرب $هـ^{٣س}$ عامل مشترك "

$ص'' = هـ^{٣س}(٩+٣(٩+٩س)) = هـ^{٣س}(٩+٢٧+٢٧س) = هـ^{٣س}(٣٦+٢٧س)$

الطرف الأيسر / $ص'' - ٦ص' + ٩ص = هـ^{٣س}(٣٦+٢٧س) - ٦هـ^{٣س}(٩+٩س) + ٩هـ^{٣س}(١+٣س)$

$= هـ^{٣س}(٣٦+٢٧س - ٦(٩+٩س) + ٩(١+٣س))$

$= هـ^{٣س}(٣٦+٢٧س - ٥٤ - ٥٤س + ٩ + ٢٧س)$

$= هـ^{٣س}((٣٦-٥٤+٩) + (٢٧س-٥٤س+٢٧س))$

$= هـ^{٣س} \times ٠ = ٠$ ✓

• 2021 دورأول / ما قيمة $\lim_{س\to ٠} \frac{١-جتاس}{س جاس}$ باستخدام قاعدة لوبيتال

الحل / $\lim_{س\to ٠} \frac{١-جتاس}{س جاس} = \frac{١-جتا(٠)}{٠ \times حا(٠)} = \frac{١-١}{٠\times ٠} = \frac{٠}{٠}$

باستخدام لوبيتال / $\lim_{س\to 0} \frac{جاس}{س جتاس + جاس} = \lim_{س\to 0} \frac{جا(س)}{س جتا(س) + جا(س)} = \frac{1}{1+1}$

لوبيتال مرة ثانية / $= \lim_{س\to 0} \frac{-جاس}{-س جاس + جتاس + جتاس} = \lim_{س\to 0} \frac{جا(س)}{-س جا(س) + جتا(س) + جتا(س)}$

$= \frac{1}{2}$

• 2021 دور ثاني / ماهية $\lim_{س\to 0} \frac{هـ^{س^2} - هـ^{س}}{س^3}$ و باستخدام قاعدة لوبيتال .

الحل / $\lim_{س\to 0} \frac{هـ^{س^2} - هـ^{س}}{س^3} = \frac{هـ^{0} - هـ^{0}}{0 \times 3} = \frac{1-1}{0} = \frac{0}{0}$

باستخدام لوبيتال / $\lim_{س\to 0} \frac{هـ^{س^2} \times 2س - هـ^{س}}{3} = \frac{هـ^{0} \times 2 \times 0 - هـ^{0}}{3} = \frac{0-1}{3} = \frac{-1}{3}$

• 2022 دور أول / جد $\lim_{س\to 0} \frac{لو_هـ(س+1)}{هـ^{س} - 1}$

الحل / $\lim_{س\to 0} \frac{لو_هـ(س+1)}{هـ^{س} - 1} = \frac{لو_هـ 1}{هـ^{0} - 1} = \frac{0}{1-1} = \frac{0}{0}$

باستخدام لوبيتال / $\lim_{س\to 0} \frac{\frac{1}{س+1}}{هـ^{س} \times 1 - 0} = \frac{1}{هـ^{0}} = \frac{1}{1} = 1$

أ.مي حوّاري

• 2022 دور ثاني / إذا كانت $\lim_{س\to 2} \frac{ق(س) - 8}{س - 2} = 5$ ماهية $\lim_{س\to 2} \frac{3س^2 - 4}{س ق(س) - 16}$

الحل / * $\lim_{س\to 2} \frac{ق(س) - 8}{س - 2} = \frac{ق(2) - 8}{2 - 2} = \frac{ق(2) - 8}{0}$

بما أن المقام = 0 والنهاية موجودة ← البسط = 0 ← ق(2) - 8 = 0 ← ق(2) = 8

باستخدام لوبيتال / $\lim_{س\to 2} \frac{ق'(س)}{1} = ق'(2) = 5$

* المطلوب / $\lim_{س\to 2} \frac{3س^2 - 4}{س ق(س) - 16} = \frac{3س^2 - 4}{16 - ق(س)} = \frac{4 - 4}{16 - ق(2)} = \frac{0}{16 - 8 \times 2} = \frac{0}{0}$

باستخدام لوبيتال / $\lim_{س\to 2} \frac{2}{س ق'(س) + ق(س)} = \frac{2}{2 ق'(2) + ق(2)} = \frac{2}{2(5) + 8} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$

• 2023 دور ثاني/ إذا كان $ق(س) = ٢هـ^{٣س} - \frac{٢}{هـ^{٣س}}$ بيّن أن

$ق''(س) - ٤ق(س) + ق(ث) = ٨$

الحل/ $ق'(س) = ٢هـ^{٣س} - ٢هـ^{-٣س}$

$ق''(س) = ٣×٢هـ^{٣س} - ٢×-٣هـ^{-٣س} \Leftarrow ق''(س) = ٤هـ^{٣س} + ٤هـ^{-٣س}$

$ق'''(س) = ٤هـ^{٣س}×٣ + ٤هـ^{-٣س}×-٣ = ١٢هـ^{٣س} - ١٢هـ^{-٣س}$

الطرف الأيمن/ $ق'''(س) - ٤ق'(س) + ق(ث)$

$= ١٢هـ^{٣س} - ١٢هـ^{-٣س} - ٤(٢هـ^{٣س} - ٢هـ^{-٣س}) + (٤هـ^{ث} + ٤هـ^{ث})$

$= ١٢هـ^{٣س} - ١٢هـ^{-٣س} - ٨هـ^{٣س} + ٨هـ^{-٣س} + (٤+٤) = ٨ \neq$

• 2024 دور أول/ اذا كان $ق'(ث) = ٩$ ، $ق(ث) = ٧$ جد: نهـا $\frac{هـ^{ق(س)} - هـ^{س}}{س - ٢ل(س+١)}$ ، س $\to$ ث

الحل/ نهـا $\frac{هـ^{ق(س)} - هـ^{س}}{س - ٢ل(س+١)} = \frac{هـ^{ق(ث)} - هـ^{ث}}{ث - ٢ل١} = \frac{هـ - ١}{ث - ٠} = \frac{١-١}{ث} = \frac{٠}{ث}$

باستخدام لوبيتال/ نهـا $\frac{هـ^{ق(س)} \times ق'(س) - هـ^{س}}{\frac{١}{س+١} - ١} = \frac{هـ^{ق(ث)} \times ق'(ث) - هـ^{ث}}{\frac{١}{٢} - ١} = \frac{هـ \times ٩ - هـ}{-\frac{١}{٢}} = \frac{٨هـ - ١}{-\frac{١}{٢}}$

$= \frac{٨-١}{١} = ٦$

• 2024 دور ثاني/ إذا كان $ل(س)$ متصل عند ١ وكان $ق(س) = س ل(س)$ جد $ق'(١)$ علماً بأن نهـا $\frac{ل(س)}{س \to ١ \; س^{٣} - ١} = ٤$

الحل/ نهـا $\frac{ل(س)}{س \to ١ \; س^{٣} - ١} = \frac{ل(١)}{١ - ١} = \frac{ل(١)}{ث}$

بما أن المقام = ث ، والنهاية موجودة اذن البسط = ث $\Leftarrow ل(١) = ث$

باستخدام لوبيتال/ نهـا $\frac{ل'(س)}{س \to ١ \; ٣س^{٢}} = \frac{ل'(١)}{٣} = ٤ \Leftarrow ل'(١) = ١٢$

* $ق(س) = س ل(س)$

$ق'(س) = س ل'(س) + ل(س) \times ١$

$ق'(١) = ل'(١) + ل(١) = ١٢ + ث = ١٢$

أ.ميّ حوّاري

• 2025 دور أول/ إذا كان $ص = لو_{ق}(ق^{اس} + ظ^{اس})$ ، أثبت أن $(ص')^{٢} + ص'' = ق^{اس} \times هـ^{ص}$

الحل/ $ص' = \frac{ق^{اس} ظ^{اس} + ق^{أس}}{ق^{اس} + ظ^{اس}} = \frac{ق^{اس}(ظ^{اس} + ق^{اس})}{(ق^{اس} + ظ^{اس})} = ق^{اس}$

$ص'' = ق^{اس} ظ^{اس}$.

$(ص+ص)^2 = ص^2 + (قاس)^2 + قاس ظاس$ = $قا^2س + قاس ظاس$ باخراج قاس عامل مشترك

$= قاس(قاس + ظاس)$

$= قاس \times ه_{ص}$ #

ملاحظة / إذا $(قاس + ظاس) = ص \Leftarrow ه_{ص} = قاس + ظاس$

• 2025 جنوب نابلس/ إذا كان $نها_{س \to 1} \frac{س^3 + ق(س)}{(س-1)^2} = 7$ أجد قاعدة $ق(س)$ حيث $ق(س)$ كثير حدود من الدرجة الثانية.

الحل $ق(س) = أس^2 + بس + جـ$ ، $أ \neq 0$ ، $أ، ب، جـ \in ح$

$\Leftarrow س^3 + ق(س) = (س^3 + أس^2) + بس + جـ = س^3(1+أ) + بس + جـ$

$\Leftarrow نها_{س \to 1} \frac{س^3(1+أ) + بس + جـ}{(س-1)^2} = 7$

أ.مي حواري

$نها_{س \to 1} \frac{(1+أ)س^3 + بس + جـ}{(س-1)^2} = \frac{(1+أ) + ب + جـ}{0} = \frac{1+أ+ب+جـ}{0}$

بما أن المقام $= 0$ والنهاية موجودة $\Leftarrow$ البسط $= 0 \Leftarrow 1+أ+ب+جـ = 0 \Leftarrow أ+ب+جـ = -1$ معادلة (1)

باستخدام لوبيتال /

$نها_{س \to 1} \frac{3(1+أ)س + ب}{2(س-1)} = \frac{3(1+أ) + ب}{2(1-1)} = \frac{3(1+أ)+ب}{0}$

المقام $= 0$ والنهاية موجودة $\Leftarrow$ البسط $= 0 \Leftarrow 3(1+أ) + ب = 0$

$\Leftarrow 3أ + ب = -3$ معادلة (2)

لوبيتال مرة ثانية / $نها_{س \to 1} \frac{6(1+أ)}{2} = 7 \Leftarrow 1+أ = 7 \Leftarrow أ = 6$ نعوضها في معادلة (2)

$\Leftarrow 3 \times 6 + ب = -3 \Leftarrow 18 + ب = -3 \Leftarrow ب = -3 - 18 \Leftarrow ب = -21$

نعوض $(أ، ب)$ في معادلة (1)/


$6 - 21 + جـ = -1 \Leftarrow -15 + جـ = -1 \Leftarrow جـ = 15$

$\Leftarrow ق(س) = 6س^2 - 21س + 15$

• 2025 جنوب نابلس/ إذا كان $ق(س) = \begin{cases} أس^3 + بس + 5 & ، س \leq 1 \\ لوس + بس^2 & ، 1 \leq س \leq 3 \end{cases}$ وكان

$ق(س)$ قابلاً للاشتقاق على $]0، 3[$ ما قيمة الثابتين $أ، ب$

الحل / $ق(س)$ قابلاً للاشتقاق على $]0، 3[\Leftarrow ق(س)$ قابلاً للاشتقاق عند $(س = 1)$.



• 2025 سلفيت / اذا كان ص = (1+ 2س) هـ^(3س) أثبت أن ص'' − 6ص' + 9ص = ٠
• مكرر (2020 دور أول)

أ.مي حواري

هناك لذّة خفيّة..

قد لا يُدركها كثير من النّاس، وهي لذّة التَّرك، أن تَترك شهوة وأنت قادر عليها، متملّك منها، لكنّك تتركها راغبًا بغاية أعظم! وهذا التَّرك = تربية، تُربّي نفسك على ألّا تكون متاحًا لكلّ شيء، ألّا تُساق خلف شهوة عابرة ولحظة غابرة، قد تشتهي وتحترق دواخلك؛ لكنّك تُخبّئ في ذاتك معنًى أسمى وأبعد من مجرّد لُقمة، مشهد، تصفُّح، لذّة، أو أيّ صغير يَعظُم بالتّراكُم، تحتاج إلى شدّة تؤدِّب فيها خُطاك، حتّى لا تميل

الدرس الخامس | تطبيقات هندسية وفيزيائية

• القسم الأول | اختر الإجابة الصحيحة

• 2017 دور أول / إذا كان ميل المماس لمنحنى ق(س) عند (٢، ٥٦) يساوي $\frac{1}{4}$ فإن معادلة العمودي على المماس لمنحنى ق(س) عند نفس النقطة هو:

أ/ ص = ٣ + ٣س٤ ب/ ص = -٣س٤ + ١٣ ج/ ٤ص = س + ١٨

د/ ٤ص = س + ٢٢

الحل/ ميل العمودي = $\frac{-1}{\text{ميل المماس}}$ = $\frac{-1}{-4}$ = ٤

م = -٤ (س١، ص١) = (٢، ٥٦)

معادلة العمودي/ ص - ص١ = م(س - س١) ← ص - ٥ = -٤(س - ٢) ← ص - ٥ = -٤س + ٨

+٥ +٥

← ص = -٤س + ١٣

• 2018 دور أول / أطلق جسم رأسيًا لأعلى من نقطة على سطح الأرض حسب العلاقة ف = ٢٤ن - ٤ن^{٢} ف: الإزاحة بالأمتار، ن الزمن بالثواني، جد أقصى ارتفاع يصله الجسم عن سطح الأرض:

أ/ ٧٢م ب/ ٣٦م ج/ ٢٣م د/ ١٦م

الحل/ ف = ٢٤ن - ٤ن^{٢}

ع = $\frac{\text{ف}}{\text{ن}}$ = ٢٤ - ٨ن ← ٠ = ٢٤ - ٨ن ← ٨ن = ٢٤ ← ن = $\frac{٢٤}{٨}$ = ٣ ن "زمن الوصول لأقصى ارتفاع"

أقصى ارتفاع = ف(٣) = ٢٤×٣ - ٤×٣^{٢} = ٧٢ - ٣٦ = ٣٦م

• 2019 دور ثالث / يتحرك جسم في خط مستقيم حيث أن بعده ف عن نقطة الأصل بالأمتار بعد (ن) ثانية يعطى بالعلاقة ف = ن^{٣} + ٦ن، ما تسارع الجسم بعد مرور ثانيتين من بدء الحركة

أ/ ٦م/ث^{٢} ب/ ٧م/ث^{٢} ج/ ١٢م/ث^{٢} د/ ١٣م/ث^{٢}

الحل/ ف = ن^{٣} + ٦ن ← ع = $\frac{\text{ف}}{\text{ن}}$ = ٣ن^{٢} + ٦ ← ت = $\frac{\text{ع}}{\text{ن}}$ = ٦ن

ت(٢) = ٦×٢ = ١٢م/ث^{٢}

أ.مي حوّاري

• 2020 دور أول / إذا كان المستقيم ص = $-\frac{1}{2}$س - $\frac{9}{2}$ عموديًا على منحنى ق(س) = ٢س^{٢} - ٤س + ٥ عند س = ١، ما قيمة الثابت ٢

أ/ ١٠-٢ ب/ ٧ ج/ ٢ د/ ٣

الحل/ ص = $-\frac{1}{2}$س - $\frac{9}{2}$ ← ص = $\frac{-1}{2}$ = ميل العمودي عند (س = ١)

← ميل المماس = $\frac{-1}{\text{ميل العمودي}}$ = ٢

ق'(س) = ٢٢س - ٤ ← ميل المماس = ق'(١) = ٢٢ - ٤ ← ٢٢ - ٤ = ٢

$\frac{٦}{٢}$ = $\frac{٢٢}{٢}$ ← ٢ = ٣

• 2020 دور ثالث/ إذا كانت معادلة العمودي على منحنى ق(س) عند (٣، ٦) هي ٢س - ٣ص = ٦
ما قيمة ق'(٣)

أ/ ٣/٢ ب/ -٣/٢ ج/ ٢/٣ د/ -٢/٣

الحل/ معادلة العمودي ٢س - ٣ص = ٦ ⇐ -٣ص = -٢س + ٦ ÷ -٣ ⇐ ص = ٢/٣ س - ٢ ⇐ ميل العمودي = ٢/٣

ميل المماس = ق'(٣) = -١ / ميل العمودي = -١ / ٢/٣ = -٣/٢

• 2021 دور أول/ إذا كان ق(س) = ل(س) / (س^٤ + ٢) وكان المماس لمنحنى ل(س) عند النقطة (-١، ٢) أفقياً
ما قيمة ق'(-١)

أ/ -٤/٩ ب/ -١/٩ ج/ ٤/٩ د/ ٧/٩

الحل/ المماس لمنحنى ل(س) عند (-١، ٢) أفقياً ⇐ ل(-١) = ٢
ل'(-١) = ٠ لأنه أفقي

أ.مي حوّاري

ق(س) = ل(س) / (س^٤ + ٢) ⇐ ق'(س) = [(س^٤ + ٢) ل'(س) - ل(س)(٤س^٣)] / (س^٤ + ٢)^٢

ق'(-١) = [((-١)^٤ + ٢) ل'(-١) - ل(-١) × ٤ × -١] / ((-١)^٤ + ٢)^٢ = [٣ × ٠ - ٢ × ٤ × -١] / ٣^٢ = ٨/٩

• 2022 دور أول/ تحرك جسيم وفق العلاقة ف(ن) = ن^٤ - ٨ن^٢ + ١٨ ما السرعة المتوسطة للجسيم في الفترة [٤، ٥]

أ/ ٢م/ث ب/ ١م/ث ج/ -١م/ث د/ -٢م/ث

الحل/ السرعة المتوسطة = ف(٥) - ف(٤) / ٥ - ٤ = (٥^٤ - ٨×٥^٢ + ١٨) - (٤^٤ - ٨×٤^٢ + ١٨)

= (٦٢٥ - ٤٠٠ + ١٨) - (٢٥٦ - ٣٢ + ١٨) = (-١٥ + ١٨) - (-١٦ + ١٨)

= ٣ - ٢ = ١م/ث

• 2022 دور أول/ إذا كان المستقيم ص = -٣س + د يمس منحنى ق(س) = -٢س^٤ + ٥س
ما قيمة الثابت د:

أ/ -٤ ب/ ٣ ج/ ٤ د/ ٨

الحل/ نفرض نقطة التماس (س، ق(س))
ق'(س) = -٨س^٣ + ٥ = ميل المنحنى عند (س، ق(س))
ص = -٣س + د ⇐ ميل المماس = -٣
⇐ -٨س^٣ + ٥ = -٣ ⇐ -٨س^٣ = -٨ ⇐ س = ١
ق(١) = -٢ × ١^٤ + ٥ × ١ = -٢ + ٥ = ٣ ⇐ (١، ٣) نقطة التماس
(١، ٣) ∈ المماس ⇐ ٣ = -٣ × ١ + د ⇐ ٣ + ٣ = د ⇐ د = ٦

. 2022 دورثاني/ ما ميل المماس لمنحنى ص = لو$_{هـ}$ س^{٢} عند النقطة (هـ، ٢)

$\frac{٧}{٩}$ د/s $\frac{١}{هـ}$ ج/ $\frac{٢}{٤}$ ب/ $\frac{٢}{هـ}$ ١٩/

الحل/

ص = لو$_{هـ}$ س^{٢} ⟸ ص = ٢ لو$_{هـ}$ س ⟸ ص$_{ى}$ = $\frac{٢}{س}$

ميل المماس = ص$_{ى}$ $|_{س=هـ}$ = $\frac{٢}{هـ}$

أ.مي حواري

. 2022 دورثالث/ قذف جسم رأسيًا لأعلى من سطح الأرض بحيث يتحدد بعده عن سطح الأرض بالعلاقة ف(ن) = ٢٠ن - ٥ن^{٢} ، حيث ف(ن) تمثل ارتفاع الجسم بالأمتار بعد ن ثانية

ما أقصى ارتفاع يصله الجسم ؟

٧٠ م/ ب/ ١٥ ج/ ٢٠ د/ ٤٠

الحل/ ف(ن) = ٢٠ن - ٥ن^{٢}

ف$_{ى}$(ن) = $\frac{ف}{ن}$ = ٢٠ - ١٠ن ⟸ ٠ = ٢٠ - ١٠ن ⟸ ن = ٢ ثانية ← زمن الوصول لأقصى ارتفاع

أقصى ارتفاع = ف(٢) = ٢٠ × ٢ - ٥ × ٢^{٢} = ٤٠ - ٢٠ = ٢٠ م

. 2022 دورثالث/ اذا كان ق(س) = س^{٤} - ٤س + ٥ ، ما معادلة العمودي على منحنى ق(س) عند س = ٣

م/ ص + س + ٢ = ٠ ب/ ص + س - ٧ = ٠ ج/ ٦ = ص - ٣س د/ ص + س + ٢ = ٠

الحل/ ق(٣) = ٣^{٤} - ٤ × ٣ + ٥ = ٨١ - ١٢ + ٥ = ٧٤ ⟸ (٣، ٢٤) نقطة التماس

ق$_{ى}$(س) = ٤س^{٣} - ٤ ⟸ ق$_{ى}$(٣) = ٤ × ٣^{٣} - ٤ = ٢٤ = ميل المماس

⟸ ميل العمودي = $\frac{-١}{\text{ميل المماس}}$ = $\frac{-١}{٢٤}$

معادلة العمودي/ ص - ص$_{١}$ = م(س - س$_{١}$) ⟸ ص - ٢٤ = $\frac{-١}{٢٤}$(س - ٣)

٢٤ص - ٥٧٦ = -س + ٣ ⟸ ٢٤ص + س - ٥٧٩ = ٠

. 2023 دورثاني/ يتحرك جسم على خط مستقيم وفق العلاقة ف(ن) = ن^{٣} - ٣ن^{٢} + ٥ن + ٦ حيث ف بعده بالأمتار ، ن الزمن بالثواني ، ما سرعة الجسم عندما ينعدم التسارع :

٣م/ث ب/ ٢م/ث ج/ ٩م/ث د/ ٢٥م/ث

الحل/ ينعدم التسارع ⟸ ت(ن) = ٠

ف = ن^{٣} - ٣ن^{٢} + ٥ن + ٦ ⟸ ع = $\frac{ف}{ن}$ = ٣ن^{٢} - ٦ن + ٥ ⟸ ت = $\frac{ع}{ن}$ = ٦ن - ٦ = ٠

⟸ ٦ن = ٦ ⟸ ن = ١ ث ← زمن انعدام التسارع ،

ع(١) = ٣(١)^{٢} - ٦(١) + ٥ = ٣ - ٦ + ٥ = ٢م/ث

• 2024 دور أول/ إذا كان لمنحنيين $ق_1(س)=ب س^3+1$ ، $ق_2(س)=س^3+ب س$ مماسًا مشتركًا عند $(س=1)$ ، ما قيمة الثابتة $ب$ على الترتيب؟

أ/ -3، -6 ب/ 3، 6 ج/ -3، 6 د/ 3، -6

الحل/ لـ $ق_1$، $ق_2$ مماسًا مشتركًا عند $س=1$

$ق_1(1)=ق_2(1)$ ← $ق_1(1)=ق_2(1)$

* $ق_1(1)=ق_2(1) \Leftarrow ب(1)^3+1=(1)^3+ب(1) \Leftarrow ب+1=1+ب \Leftarrow ب-ب=1-1$ ... (1)

* $ق_1'(س)=3ب س^2 \Leftarrow ق_1'(1)=3ب$

$ق_2'(س)=3س^2+ب \Leftarrow ق_2'(1)=3+ب$

$ق_1'(1)=ق_2'(1) \Leftarrow 3ب=3+ب \Leftarrow 3ب-ب=3$ ... (2)

بطرح (2) − (1)/ $2ب=3$ نعوضها في (1) $\Leftarrow 3-ب=1 \Leftarrow ب=3-1=2$

$(ب=2)$ ← (ج)

• 2025 دور أول/ اذا كان ميل المماس لمنحنى $ق(س)=$ جاس + جتاس $\forall س \in [0, \frac{\pi}{2}]$ عند النقطة $ب(س،ص)$ أفقيًا، جد احداثيات نقطة التماس

أ/ $(0، \frac{\pi}{6})$ ب/ $(0، \frac{1}{12}\pi)$ ج/ $(0، \frac{7}{12}\pi)$ د/ $(0، \frac{\pi}{4})$

الحل/ $ق'(س)=$ جتاس − جاس

المماس أفقي ⇐ ميله $=0 \Leftarrow$ جتاس − جاس $=0 \Leftarrow \frac{\text{جاس}}{\text{جتاس}}=\frac{\text{جاس}}{\text{جتاس}}$

$\Leftarrow$ ظاس $=1 \Leftarrow س=\frac{\pi}{4} \in [0, \frac{\pi}{2}[$.

$ق(\frac{\pi}{4})=$ جا$(\frac{\pi}{4})+$ جتا$(\frac{\pi}{4})=\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\times\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$

$\Leftarrow$ نقطة التماس $=(\frac{\pi}{4}، \sqrt{2})$

أ.مي حوّاري

• 2025 دور ثاني/ إذا كان ميل المماس لمنحنى $ق(س)=س^3+س-2$ عند النقطة $ب(س،ص)$ يساوي (7)، جد احداثيات النقطة التماس

أ/ $(-3، -10)$ ب/ $(3، 10)$ ج/ $(3، 0)$ د/ $(3، 1)$

الحل/ $ق'(س)=3س^2+1 \Leftarrow$ ميل المماس $=3س^2+1=7 \Leftarrow \frac{6}{2}=س^2 \Leftarrow س=3$

$ق(3)=3^3+3-2=27+3-2=28 \Leftarrow$ نقطة التماس $(3، 10)$

• 2025 شمال الخليل/ يتحرك جسم في خط مستقيم وفق العلاقة $ف(ن)=ن جـ^{ن-2}$ وكان تسارعه بعد ثانيتين يساوي أربعة أمثال تسارعه بعد ثانية واحدة ما قيمة الثابت جـ؟ جـ > 1

أ/ 2 ب/ 3 ج/ 4 د/ 5

الحل/ $ف=ن جـ^{ن-2} \Leftarrow ع=\frac{ف}{ن}=جـ^{ن-2} \Leftarrow ت=\frac{ع}{ن}=جـ^{ن-2}(جـ-1)$

$ت(3)=جـ^{3-2}(جـ-1)=جـ-1$

$ت(2)=جـ^{2-2}(جـ-1)=جـ-1$

$جـ-1=4(جـ-1) \Leftarrow جـ-1=4جـ-4 \Leftarrow 3=3جـ \Leftarrow جـ=1$ (مرفوض)

$جـ-1=0 \Leftarrow جـ=1$

ن(٢) = ٤ن(١) ← ب(ب-١)(٢)^{ب-٢} = ٤ب(ب-١)(١)^{ب-٢} ب≠٠، ب≠١

← (٢)^{ب-٢} = ٤ ← ٢^{ب-٢} = ٢^٢ «بالمساواة الأساسات ← الأسس متساوية»

← ب-٢ = ٢ ← ب = ٤

• خارجي / إذا كانت معادلة العمودي على المماس لمنحنى ق(س) عند (س=٢) هي ص = ½س + ٣
ما قيمة نهـ_{س←٢} (ق(س) - ٤) / (س^٣ + س - ٦)

أ) ٨/١ ب) ١٠/١ ج) -٥/٢ د) ٥/٢

الحل/ (٢، ق(٢)) ∈ للعمودي ← ق(٢) = ½×٢ + ٣ = ١ + ٣ = ٤

ص = ½س + ٣ ← ص = ½ = ميل العمودي

← ميل المماس = -١ / ميل العمودي = -٢ = ق'(٢)

نهـ_{س←٢} (ق(س) - ٤) / (س^٣ + س - ٦) = (ق(٢) - ٤) / (٢^٣ + ٢ - ٦) = ٠/٠

بالاستعانة لهوسبتال / نهـ_{س←٢} ق'(س) / (٣س^٢ + ١) = ق'(٢) / (٣×٤ + ١) = -٢/١٣

أ.مي حوّاري

• خارجي/ ما معادلة العمودي على المماس لمنحنى ق(س) = لو_٥ ظاس عند النقطة الواقعة عليه وإحداثيها السيني = π/٤

أ) ص = ٤س - π ب) ص = ٤س + π

ج) ص = -٤س - π د) ص = -¼س - π

الحل/ ق'(س) = قاس / ظاس ← ق'(π/٤) = قا^٢(π/٤) / ظا(π/٤) = (√٢)^٢ / ١ = ٢ = ميل المماس

← ميل العمودي = -١ / ميل المماس = -½

ق(π/٤) = لو_٥ ظا(π/٤) = لو_٥ ١ = ٠ ← (π/٤ ، ٠) نقطة تماس.

معادلة العمودي / ص - ص_١ = م(س - س_١) ← ص - ٠ = -½ (س - π/٤)

ص = -½س + π/٨] × ٨ ← ٨ص = -٤س + π

٨ص = π - ٤س

• القسم الثاني | أجب عن الأسئلة الآتية:

• 2018 دور أول/ جد معادلة المماس لمنحنى الاقتران ق(س) = ٦س - ٣س^٢ عند النقطة التي احداثيها السيني س = ٢

الحل/ ق(٢) = ٦(٢) - ٣(٢)^٢ = ١٢ - ٨ = ٤ ← (٢، ٤) نقطة تماس

$ق'(س) = -6 - 4س$ ⇐ ميل المماس $= ق'(-2) = -6 - 4 \times -2 = -6 + 8 = 2$

معادلة المماس / $ص - ص_1 = م(س - س_1)$

$ص - 4 = 2(س - -2)$ ⇐ $ص - 4 = 2س + 4$ ⇐ $ص = 2س + 8$

• 2019 دور ثالث / إذا كان $ق(س) = هـ^{س} \ لو_{هـ}(س)$ جد معادلة المماس لمنحنى الاقتران $ق(س)$ عند $س = 1$

الحل / $ق(1) = هـ^{1} \ لو_{هـ}1 = هـ \times 0 = 0$ ⇐ $(1 ، 0)$ نقطة تماس .

$ق'(س) = هـ^{س} \times \frac{1}{س} + هـ^{س} \times لو_{هـ}س$

ميل المماس $= ق'(1) = هـ + هـ^{1} \times لو_{هـ}1 = هـ + هـ \times 0 = هـ$

معادلة المماس / $ص - ص_1 = م(س - س_1)$ ⇐ $ص - 0 = هـ(س - 1)$ ⇐ $ص = هـس - هـ$

• 2019 دور ثاني / جد معادلة المماس على منحنى $ق(س) = \frac{3س}{س - 2}$ ، $س \neq 2$ عندما $س = 8$

الحل / $ق(8) = \frac{3 \times 8}{8 - 2} = \frac{24}{6} = 4$ ⇐ $(8 ، 4)$ نقطة التماس .

$ق'(س) = \frac{(س - 2)(3) - 3س}{(س - 2)^2} = \frac{3س - 6 - 3س}{(س - 2)^2} = \frac{-6}{(س - 2)^2}$

ميل المماس $= ق'(8) = \frac{-6}{(8 - 2)^2} = \frac{-6}{36} = -\frac{1}{6}$

معادلة المماس / $ص - ص_1 = م(س - س_1)$ ⇐ $ص - 4 = -\frac{1}{6}(س - 8)$ ⇐ $ص = -\frac{1}{6}س + \frac{4}{3} + 4$

$ص = -\frac{1}{6}س + \frac{16}{3}$

• 2020 دور أول / جد معادلة المماس لمنحنى $ص = لو_{هـ}(2 - 2\sqrt{7} جتا س)$ عند النقطة $(\frac{\pi}{4} ، ق(\frac{\pi}{4}))$

الحل / $ص = ق(س) = لو_{هـ}(2 - 2\sqrt{7} جتا س)$

$ق(\frac{\pi}{4}) = لو_{هـ}(2 - 2\sqrt{7} جتا \frac{\pi}{4}) = لو_{هـ}(2 - 2\sqrt{7} \times \frac{1}{\sqrt{2}}) = لو_{هـ}1 = 0$

⇐ $(\frac{\pi}{4} ، 0)$ نقطة تماس

$ق'(س) = \frac{-2\sqrt{7} \times -جتا س}{2 - 2\sqrt{7} جتا س}$ ⇐ ميل المماس $= ق'(\frac{\pi}{4}) = \frac{2\sqrt{7} جتا(\frac{\pi}{4})}{2 - 2\sqrt{7} جتا(\frac{\pi}{4})}$


⇐ ميل المماس $= \frac{2\sqrt{7} \times \frac{1}{\sqrt{2}}}{2 - 2\sqrt{7} \times \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{1} = 1$

معادلة المماس / $ص - ص_1 = م(س - س_1)$ ⇐ $ص - 0 = 1(س - \frac{\pi}{4})$

$ص = س - \frac{\pi}{4}$

أ.مي حوّاري

• 2020 دور أول / قذف جسم رأسيًا لأعلى من قمة برج ارتفاعه ٨٠ متر فكانت إزاحته من قمة البرج تعطى بالعلاقة $ف = 30ن - 5ن^2$ ، $ف(ن)$ تمثل ارتفاع الجسم من قمة البرج بعد $ن$ ثانية ، أوجد :



أ.ميّ حوّاري

أ/ أقصى ارتفاع يصله الجسم عند قمة البرج

ب/ الزمن الذي استغرقه الجسم للوصول إلى سطح الأرض

الحل/ أ/ ف = ٣٠ن - ٥ن^٢

ع = ف' = ٣٠ - ١٠ن = ٠ ⇐ ١٠ن = ٣٠ ⇐ ن = ٣ ث

⇐ ن = ٣ ث زمن الوصول لأقصى ارتفاع "

أقصى ارتفاع عند البرج = ف(٣) = ٣٠×٣ - ٥×٣^٢

= ٩٠ - ٤٥ = ٤٥ م

ب/ عندما يصطدم الجسم إلى سطح الأرض تكون

ف(ن) = -٨٠ م ⇐ تحت المستوى الصفري

⇐ ٣٠ن - ٥ن^٢ = -٨٠ ⇐ ٥ن^٢ - ٣٠ن - ٨٠ = ٠ ÷ ٥

⇐ ن^٢ - ٦ن - ١٦ = ٠ ⇐ (ن - ٨)(ن + ٢) = ٠

إما ن + ٢ = ٠ ⇐ ن = -٢ مرفوضة ن > ٠

أو ن - ٨ = ٠ ⇐ ن = ٨ ث

• 2020 دورة ثاني/ جد معادلة المماس لمنحنى ق(س) = هـ^س عند النقطة التي تقع عليه وأحداثيها السيني يساوي ١

الحل/ ق(١) = هـ^١ = هـ ⇐ (١، هـ) نقطة تماس.

ق'(س) = هـ^س × ١ - هـ^س × ٣س^٢

ميل المماس = ق'(١) = هـ - ٣هـ = -٢هـ

معادلة المماس/ ص - ص١ = م(س - س١)

ص - هـ = -٢هـ(س - ١)

ص = -٢هـس + ٢هـ + هـ

ص = -٢هـس + ٣هـ ⇐ هـص = -٢س + ٣

• 2020 دورة ثالث/ جد معادلة المماس على منحنى ق(س) = هـ^(جا٣س) + لو_هـ(١ + جاس) عند (س = ٠)

الحل/ ق(٠) = هـ^(جا٠) + لو_هـ(١ + جا٠) = هـ^٠ + لو_هـ ١ = ١ + ٠ = ١ ⇐ (٠، ١) نقطة تماس

ق'(س) = هـ^(جا٣س) × ٣جتا(٣س) + جتاس / (١ + جاس)


ميل المماس = ق'(٠) = ٣جتا٠ هـ^(جا٠) + جتا٠ / (١ + جا٠) = ٣ × ١ × هـ^٠ + ١/١ = ٣ + ١ = ٤

معادلة المماس/ ص - ص١ = م(س - س١)

ص - ١ = ٣(س - ٠)

ص - ١ = ٣س ⇐ ص = ٣س + ١

• 2020 دور ثالث / قذف جسم رأسيًا لأعلى من سطح الأرض فكانت إزاحته من سطح الأرض تعطى بالعلاقة ف(ن) = ٣٠ن - ٥ن² حيث ف(ن) تمثل إزاحة الجسم بالأمتار بعد (ن) ثانية أوجد سرعة الجسم عندما يقطع مسافة (٦٥ متر)



الحل / ف = ٣٠ن - ٥ن² ← ع = ف/ن = ٣٠ - ١٠ن

← ع = ن = ٣٠ - ١٠ن ← ١٠ن = ٣٠ ← ن = ٣ ث

أقصى ارتفاع = ف(٣) = ٣٠×٣ - ٥×٣² = ٩٠ - ٤٥ = ٤٥م

المسافة المقطوعة = ٢ أقصى ارتفاع - ف(ن)

٦٥ = ٢×٤٥ - ف(ن)

ف(ن) = ٩٠ - ٦٥ = ٢٥م

← ٣٠ن - ٥ن² = ٢٥ ← ÷٥ (ن² - ٦ن + ٥ = ٠ ← ن = ٥ ± √(٣٦ - ٢٠) / ٢

← ن = (٦ ± ٤) / ٢ ← ن = ١ ، ن = ٥

إما ن = ١ ث مرفوض الجسم يجب أن يكون صاعد

أو ن = ٥ ث ← ن = ٥ث .


ع(٥) = ٣٠ - ١٠×٥ = ٣٠ - ٥٠ = -٢٠م/ث

أ.مي حوّاري

• 2021 دور أول / قذف جسم رأسيًا للأعلى من قمة برج ارتفاعه ١٢٠م فكانت إزاحته من قمة البرج تعطى بالعلاقة ف(ن) = ٢٠ن - ٥ن² ، أوجد:

P/ أقصى ارتفاع يصله الجسم عن سطح الأرض .

ب/ سرعة الجسم عندما يكون على ارتفاع ١٥م من سطح الأرض وهو نازل



الحل / P/ ف = ٢٠ن - ٥ن²

ع = ف/ن = ٢٠ - ١٠ن = ٠ ← ن = ٢ ث

← ن = ٢ث ، زمن الوصول لأقصى ارتفاع »

أقصى ارتفاع عن البرج = ف(٢) = ٢٠×٢ - ٥×٢² = ٤٠ - ٢٠ = ٢٠م

← أقصى ارتفاع عن الأرض = ارتفاع البرج + أقصى ارتفاع عن البرج

= ١٢٠ + ٢٠ = ١٤٠م

ب/ عندما يكون الجسم على ارتفاع ١٥م عن الأرض تكون ف(ن) = ١٢٠ - ١٥ = ١٠٥ (لأن الجسم تحت المستوى الصفري)

ف(ن) = -١٠٥ ← ٢٠ن - ٥ن² = -١٠٥ ← ÷(-٥) ن² - ٤ن - ٢١ = ٠

← (ن + ٣)(ن - ٧) = ٠ ← ن = ٧ ، ن = -٣ مرفوض

إما ن + ٣ = ٠ ← ن = -٣ مرفوض

أو ن - ٧ = ٠ ← ن = ٧ث

ع(٧) = ٢٠ - ١٠×٧ = ٢٠ - ٧٠ = -٥٠م/ث

أ.مي حوّاري

• 2021 دور أول/ ما معادلة المماس لمنحنى $ه(س) = \frac{س^{٤}}{ه^{س}}$ عند $س = -١$

الحل/ $ه(س) = \frac{س^{٤}}{ه^{س}} = س^{٤} ه^{-س}$

$ه(-١) = (-١)^{٤} ه^{-(-١)} = ١ \times ه^{١} = ه$ ← $(-١، ه)$ نقطة تماس

$ه'(س) = س^{٤} ه^{-س} \times -١ + ه^{-س} \times ٤س^{٣}$

ميل المماس $= ه'(-١) = -ه + ٤ه = ٣ه$

معادلة المماس/ $ص - ص_{١} = م(س - س_{١})$ ← $ص - ه = ٣ه(س - (-١))$

$ص - ه = ٣ه س + ٣ه$ ← $ص = ٣ه س + ٤ه$

• 2021 دور ثاني/ جد معادلة المماس لمنحنى $ه(س) = ٢س لو_{ه} س$ عند $س = ه$

الحل/ $ه(ه) = ٢ه لو_{ه} ه = ٢ه \times ١ = ٢ه$ ← $(ه، ٢ه)$ نقطة التماس

$ه'(س) = ٢س \times \frac{١}{س} + ٢ لو_{ه} س$

ميل المماس $= ه'(ه) = ٢ + ٢ لو_{ه} ه = ٢ + ٢ = ٤$

معادلة المماس/ $ص - ص_{١} = م(س - س_{١})$ ← $ص - ٢ه = ٤(س - ه)$

← $ص - ٢ه = ٤س - ٤ه$ ← $ص = ٤س - ٢ه$

• 2021 دور ثاني/ يتحرك جسم على خط مستقيم وصلنا أن بعده عن نقطة ثابتة (و) يتحدد بالعلاقة $ف = ن^{٣} - ٩ن^{٢} + ٧$ حيث ف بعده بالأمتار و ن الزمن بالثواني جد:

١/ السرعة المتوسطة في $[٢، ٤]$ ٢/ تسارع الجسم عندما يعكس اتجاه حركته.

الحل/

١/ السرعة المتوسطة $= \frac{\Delta ف}{\Delta ن} = \frac{ف(٤) - ف(٢)}{٤ - ٢} = \frac{(٤^{٣} - ٩(٤)^{٢} + ٧) - (٢^{٣} - ٩(٢)^{٢} + ٧)}{٢}$

$= \frac{(٦٤ - ١٤٤ + ٧) - (٨ - ٣٦ + ٧)}{٢} = \frac{-٧٣ + ٢١}{٢} = \frac{-٥٢}{٢} = -٢٦ م/ث$

٢/ يعكس الجسم اتجاه حركته عندما $ع = ٠$ وتتغير إشارة السرعة.

$ع = \frac{\Delta ف}{\Delta ن} = ٣ن^{٢} - ١٨ن$ ← $٣ن(ن - ٦) = ٠$

إما $٣ن = ٠$ ← $ن = ٠$ بداية الحركة / أو $ن - ٦ = ٠$ ← $ن = ٦ ث$

لاحظ عندما $(ن = ٦ ث)$ توقف الجسم لحظياً ثم عكس اتجاه حركته.




$ت = \frac{\Delta ع}{\Delta ن} = ٦ن - ١٨$

$ت(٦) = ٦ \times ٦ - ١٨ = ١٨ م/ث^{٢}$

• 2022 دور أول/ قذفت كرة رأسياً لأعلى من سطح الأرض ومن أمام نبتة ارتفاعها ٥٠٠ سم فكانت إزاحته من سطح الأرض تعطى بالعلاقة $ف(ن) = ٦٠ن - ٥ن^{٢}$ حيث $ف(ن)$ تمثل إزاحة الجسم بالأمتار بعد $ن$ ثانية و أوجد:

١/ ماسرعة الكرة عندما تصل إلى مستوى سطح النبتة.



٣/ ما أقصى ارتفاع عن مستوى سطح البناية .

الحل / ١/ تصل الكرة إلى سطح البناية

ف(ن) = ٥٥ ⟸ ٥٥ = ٥ن٢ - ٦٠ن

⟸ (٥ن٢ - ٦٠ن + ٥٥ = ٠) ÷ ٥

ن٢ - ١٢ن + ١١ = ٠

(ن - ١)(ن - ١١) = ٠

إما ن - ١ = ٠ ⟸ ن = ١ ث «صاعد»

أو ن - ١١ = ٠ ⟸ ن = ١١ ث «هابط»

ع(ن) = ف' = ١٠ن - ٦٠

ع(١) = ١٠ - ٦٠ = -٥٠ م/ث

ع(١١) = ١١٠ - ٦٠ = ١١×١٠ - ٦٠ = ٥٠ م/ث

٢/ ع(ن) = ١٠ن - ٦٠ = ٠ ⟸ ١٠ن = ٦٠ ⟸ ن = ٦ ث «زمن الوصول لأقصى ارتفاع»

أقصى ارتفاع عن الأرض = ف(٦) = ٥ × ٦٢ - ٦٠ × ٦ = ٣٦٠ - ٣٦٠ = ١٨٠ م

أقصى ارتفاع عن البرج = أقصى ارتفاع عن الأرض - ارتفاع البرج

= ١٨٠ - ٥٥ = ١٢٥ م

أ.مي حوّاري

• 2022 دور ثاني / يتحرك جسم في خط مستقيم ف سم بعد ن ثانية من انطلاقه حيث ف(ن) = ن٣ + ٨ن٢ سم بعده بالأمتار عن النقطة التي انطلق منها بالثواني وكانت السرعة المتوسطة في [٢، ٦] تساوي ١٣ سم/ث جد قيمة الثابت أ

الحل / السرعة المتوسطة = $\frac{\Delta ف}{\Delta ن} = \frac{ف(٦) - ف(١)}{٦ - ١} = \frac{(٢١٦ + ٨٤) - (أ + ٨)}{٥} = ١٣$

$١٣ = \frac{٢٠٠ - أ}{٥} \Leftarrow ٦٥ = ٢٠٠ - أ \Leftarrow أ = ١٣٥$

• 2023 دور أول / إذا كانت معادلة المماس لمنحنى ق(س) عند (س = ٢) هي ٤س - ص - ٥ = ٠

وكانت معادلة العمودي على المماس لمنحنى ك(س) عند (س = ٢) هي س + ٤ص - ٢٢ = ٠ وكانت

ل(س) = $\frac{ق(س)}{ك(س)}$ ، ك(س) ≠ ٠ جد ل'(٢)

الحل / (٢، ق(٢)) ∈ للمماس / ٤س - ص - ٥ = ٠ ⟸ ٤×٢ - ق(٢) - ٥ = ٠ ⟸ ٣ - ق(٢) = ٠

⟸ ق(٢) = ٣

مماس ق(س) | س = ٢ ⟸ ٤س - ص - ٥ = ٠ ⟸ ص = ٤ - ٥ = -١ ⟸ ق'(٢) = ميل المماس

⟸ ق'(٢) = ٤

(٢، ك(٢)) ∈ للعمودي ⟸ س + ٤ص - ٢٢ = ٠ ⟸ ٢ + ٤ك(٢) - ٢٢ = ٠ ⟸ ٤ك(٢) - ٢٠ = ٠

⟸ ٤ك(٢) = ٢٠ ⟸ ك(٢) = ٥

العمودي على ه(س) | س = ٢ ⟸ س + ٤ص - ٢٢ = ٠ ⟸ ١ + ٤ص = ٠ ⟸ ص = $-\frac{١}{٤}$ = ميل العمودي

ميل المماس = $\frac{-1}{\text{ميل العمودي}}$ = $\frac{-1}{-\frac{1}{4}}$ = $4 = \text{ك}'(2)$

$\text{ل}(س) = \frac{\text{ه}(س)}{\text{و}(س)}$ ← $\text{ل}'(س) = \frac{\text{و}(س)\,\text{ه}'(س) - \text{ه}(س)\,\text{و}'(س)}{[\text{و}(س)]^2}$ ← $\text{ل}'(2) = \frac{\text{و}(2)\,\text{ه}'(2) - \text{ه}(2)\,\text{و}'(2)}{[\text{و}(2)]^2}$

← $\text{ل}'(2) = \frac{(5)(4) - (3)(4)}{5^2} = \frac{20-12}{25} = \frac{8}{25}$

• 2024 دور أول / يتحرك جسم في خط مستقيم بحيث أن بعده ف عن نقطة الانطلاق يتحدد بالعلاقة $\text{ف}(ن) = ن^3 - 6ن^2 + 7$ حيث ف بعده بالأمتار و ن الزمن بالثواني و كان تسارعه عندما $(ن = 6)$ يساوي $(18\ \text{م/ث}^2)$ ويعكس الجسم من اتجاه حركته في تلك اللحظة و جد قيم الثابتين P و ب

الحل / $\text{ت}(6) = 18$ / يعكس الجسم اتجاه حركته عندما $ن = 6$ ← $\text{ع}(6) = 0$

$\text{ف}(ن) = ن^3 - 6ن^2 + 7$ ← $\text{ع} = \text{ف}' = 3ن^2 - 12ن$

$\text{ت} = \frac{\text{ع}}{\text{ز}ن} = 6ن - 12$ ← $\text{ت}(6) = 6(6) - 12 = 24$ / $24 = 18$ ← $6P + ب = 18$ ـــ (1)

$\text{ع} = \frac{\text{ز ف}}{\text{ز}ن} = 3ن^2 - 12ن$ ← $\text{ع}(6) = 3(6)^2 - 12(6) = 0$ / $108 - 72 = 36$ ← $6P + ب = 0$ ـــ (2)

بطرح (2) − (1) / $6P = 18$ ← $P = 3$ نعوضها في (1)

$6P + ب = 18$ ← $18 + ب = 18$ ← $ب = 0$

أ.مي حوّاري

• 2024 دور ثاني / جد معادلة المماس لمنحنى $\text{ه}(س) = س\,\text{و}^{س}$ عند النقطة التي احداثيها السيني 1

الحل / $\text{ه}(1) = 1\,\text{و}^{1} = \text{و}$ ← $(1, \text{و})$ نقطة تماس .

$\text{و}'(س) = س\,\text{و}^{س} + \text{و}^{س}(1)$

ميل المماس = $\text{و}'(1) = \text{و} + \text{و} = 2\text{و}$

معادلة المماس / $ص - ص_1 = م(س - س_1)$ ← $ص - \text{و} = 2\text{و}(س - 1)$ ← $ص - \text{و} = 2\text{و}س - 2\text{و}$

$ص = 2\text{و}س - \text{و}$

• 2024 دور ثاني / قذف جسم رأسيًا لأعلى من نقطة على سطح الأرض حسب العلاقة $\text{ف}(ن) = 20ن - 5ن^2$ حيث ف هو الارتفاع بالأمتار و ن الزمن بالثواني و أوجد :

أ/ أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم

ب/ الزمن اللازم لتقطع المسافة المقطوعة 25 متر

الحل / أ/ $\text{ف}(ن) = 20ن - 5ن^2$

$\text{ع} = \frac{\text{ز ف}}{\text{ز}ن} = 20 - 10ن$ ← $0 = 20 - 10ن$ ← $ن = 2$ ث

← $ن = 2$ ث ، زمن الوصول لأقصى ارتفاع ،

$\text{ف}(2) = 20 \times 2 - 5(2)^2 = 40 - 20 = 20$ م

ب/ المسافة المقطوعة = 2 × أقصى ارتفاع − $\text{ف}(ن)$


$25 = 2 \times 20 - \text{ف}(ن)$


$\text{ف}(ن) = 40 - 25 = 15$ م

← $15 = 20ن - 5ن^2$ ← $\frac{15}{5} = \frac{20ن}{5} - ن^2$ ← $ن^2 - 4ن + 3 = 0$

$(ن - 3)(ن - 1) = 0$

إما $ن - 1 = 0$ ← $ن = 1$ ث الجسم صاعد / $ن - 3 = 0$ ← $ن = 3$ ث ، الجسم هابط ،





• 2024 دور ثالث/ اذا علمت أن الاقتران $ه(س) = \frac{س+٣}{س^٤+١}$ وكان الشكل المجاور يمثل منحنى $ل(س)$ حد متى $(ه \times ل)'(-١)$

الحل/

* من الرسمة:

$(-١،٢)$ تقع على $ل(س) \Leftarrow ل(-١) = ٢$

$ل'(-١)$ = ميل المماس $= ظ٤٥ \Leftarrow ل'(-١) = ١$

* $ه(س) = \frac{س+٣}{س^٤+١} \Leftarrow ه(-١) = \frac{-١+٣}{(-١)^٤+١} = \frac{٢}{٢} = ١ \Leftarrow ه(-١) = ١$

$ه'(س) = \frac{(س^٤+١)(١) - (س+٣)(٤س^٣)}{(س^٤+١)^٢} \Leftarrow ه'(٢) = \frac{((-١)^٤+١) - (-١+٣)(٤ \times -١)}{((-١)^٤+١)^٢}$

$\Leftarrow ه'(-١) = \frac{٢ - (٢)(-٢)}{٢^٢} = \frac{٢+٤}{٤} = \frac{٦}{٤} = \frac{٣}{٢}$

المطلوب/ $(ه \times ل)'(-١) = ه(-١) ل'(-١) + ل(-١) ه'(-١)$

$= (١)(١) + (\frac{٣}{٢})(٢) = ١+٣ = ٤$

أ.مي حوّاري

• 2025 دور أول/ قذف جسم رأسياً لأعلى من نقطة على سطح الأرض وكانت ارتفاعه عن سطح الأرض ف بالأمتار بعد $(ن)$ ثانية يعطى بالعلاقة $ف = ٩٦ن - ١٦ن^٢$ جد المسافة الكلية المقطوعة خلال الثواني الأربعة الأولى.

الحل/ $ف = ٩٦ن - ١٦ن^٢ \Leftarrow ع = \frac{ف}{ن} = ٩٦ - ١٦ن = ٠ \Leftarrow ١٦ن = ٩٦ \Leftarrow ن = ٦ث$

أقصى ارتفاع عن الأرض = $ف(٣) = ٩٦ \times ٣ - ١٦ \times ٣^٢ = ٢٨٨ - ١٤٤ = ١٤٤م$

* $ف(٤) = ٩٦ \times ٤ - ١٦ \times ٤^٢ = ٣٨٤ - ٢٥٦ = ١٢٨م$

المسافة المقطوعة = أقصى ارتفاع - $ف(ن)$

$= ٢ \times ١٤٤ - ف(٤) = ٢٨٨ - ١٢٨ = ١٦٠م$

• خارجي/ أوجد معادلة المماس الأفقي لمنحنى $ه(س) = ٣س^٤ + ٦س$

الحل/ نفرض نقطة التماس $(س، ه(س))$

$ه'(س) = ١٢س^٣ + ٦$

المماس أفقي $\Leftarrow$ ميله $= ٠ \Leftarrow ه'(س) = ٠ \Leftarrow ١٢س^٣ + ٦ = ٠ \Leftarrow ١٢س^٣ = -٦ \Leftarrow س = -\frac{١}{٢}$

$ه(-١) = ٣(-١)^٤ + ٦(-١) = ٣ - ٦ = -٣ \Leftarrow (-١، -٣)$ نقطة تماس

معادلة المماس/ $ص - ص_١ = م(س - س_١) \Leftarrow ص - (-٣) = ٠(س - (-١)) \Leftarrow ص + ٣ = ٠$

$\Leftarrow ص = -٣$

كُلٌّ في ميدانه، قائد

الدرس السادس | قاعدة السلسلة

• القسم الأول | اختر الإجابة الصحيحة :

• 2017 دور أول/ إذا كان هـ(س) = ل^{٢}(س) × ل(س) فإن الاشتقاق × جـ قَ(س)

أ/ ل(س) ل^{٢}(س) ب/ ٢ل(س) ل^{٢}(س) ج/ ٣ل^{٢}(س) ل^{٢}(س) د/ ٣ل(س) ل^{٢}(س)

الحل/ هـ(س) = (ل(س))^{٢} ⇐ قَ(س) = ٢(ل(س)) ل^{٢}(س)

• 2017 دور أول/ إذا كان ف = جا(٣ن) + جتا(٢ن) هي العلاقة بين الإزاحة ف بالأمتار والزمن (ن) بالثواني لجسم يتحرك على خط مستقيم × جـ سرعة الجسم عندما ن = $\frac{\pi}{٦}$

أ/ ٣√٣ م/ث ب/ -١ م/ث ج/ -٣√٣ م/ث د/ ٢ م/ث

الحل/ ع = $\frac{د ف}{د ن}$ = ٣جتا(٣ن) - ٢جا(٢ن)

ع($\frac{\pi}{٦}$) = ٣جتا($\frac{٣\pi}{٦}$) - ٢جا($\frac{٢\pi}{٣}$) = ٣جتا($\frac{\pi}{٢}$) - ٢جا($\frac{\pi}{٣}$)

⇐ ع($\frac{\pi}{٦}$) = ٣ × ٠ - ٢ × $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$ = -٣√٣ م/ث .

• 2017 دور أول/ إذا كان قَ(س) = جا^{٢}س × جتا^{٢}س × جـ ميل المماس لمنحنى قَ(س) عند س = $\frac{\pi}{٢}$

أ/ ١ ب/ -١ ج/ ٠ د/ $\frac{١}{٢}$

الحل/ قَ(س) = ٢جاس × جتاس × جا(٢س)

قَ($\frac{\pi}{٢}$) = جا($\frac{٢\pi}{٢}$) = جا(π) = ٠ = م ميل المماس.

• 2017 دور أول/ إذا كان (هـ(س) + س)^{٢} = ٢س^{٤} × هـ(-١) = ٣ جـ قَ(-١)

أ/ -٣ ب/ -٥ ج/ -٢ د/ -٤

الحل/ (هـ(س) + س)^{٢} = ٢س^{٤} نشتق الطرفين

٢(هـ(س) + س)(قَ(س) + ١) = ٨س^{٣} | س=-١

٢(هـ(-١) + -١)(قَ(-١) + ١) = ٨(-١)^{٣}

٢(٣ - ١)(قَ(-١) + ١) = -٨ ⇐ ٤(قَ(-١) + ١) = $\frac{-٨}{٤}$

⇐ قَ(-١) + ١ = $\frac{-٢}{١}$ ⇐ قَ(-١) = -٣

أ.ميّ حوّاري

• 2018 دور أول/ إذا كان قَ(س) = س^{٤} - ٤ هـ(٢) = ٤ هـ(٢) = -٢ جـ (هـ∘ص)′(٢)

أ/ -٢٤ ب/ -١٦ ج/ -٨ د/ ٤

الحل/ (هـ∘ص)′(٢) = قَ(ص(٢)) ص(٢)

= قَ(٤) × -٢ = (٤^{٢} - ٤) × -٢ = ١٢ × -٢ = -٢٤

• 2019 دور ثاني/ إذا كان (هـ∘ص)′(٣) = ٦ وكان قَ(١) = ٣ ، ص(٣) = ١ ما قيمة هـ(٣)

أ/ صفر ب/ $\frac{١}{٢}$ ج/ ١ د/ ٢

الحل/ (هـ∘ص)′(٣) = قَ(ص(٣)) ص(٣) = ٦ ⇐ قَ(١) × ص(٣) = ٦ ⇐ $\frac{٣}{٢}$ ص(٣) = ٦ ⇐ ص(٣) = $\frac{٦}{٣}$ = ٢

• 2020 دورأول/ إذا كان $ق(س)=س^3$ ، $ك(س)=\frac{ب}{1-س^3}$ ، $س\neq\frac{1}{2}$ ، $ب\neq0$ وكان $(ق\circ ك)'(1)=-48$ ، ما قيمة الثابت ب

P/ ٤ ب/ ٨ ج/ ١٦ د/ ٢

الحل/ $ق(س)=س^3$

$ق'(س)=3س^2$

$ك'(س)=6س$

$ك(س)=\frac{ب}{1-س^3}\Leftarrow ك(1)=ب$

$ك'(س)=\frac{-ب\times2}{(1-س^3)^2}\Leftarrow ك'(1)=\frac{-12}{(1-2)^2}=-12ب$

$*\ (ق\circ ك)'(1)=ق'(ك(1))ك'(1)\Leftarrow -48=ق'(ب)\times-12ب=-48$

$\Leftarrow 6ب\times-12ب=-48\Leftarrow -12ب^3=-48\Leftarrow ب^3=4\Leftarrow ب=2$

$\swarrow ب=-\frac{1}{2}\times2ب^2$

$\Leftarrow ب=\{2\}$.

• 2020 دورأول/ اذا كان $ص=(ع^2+1)^2$ ، $ع=س^2$ ، جد قيمة $\frac{دص}{دس}$ عندما $س=1$

P/ ١٦ ب/ ٨ ج/ $\frac{5}{3}$ د/ ١

الحل/ $ص=(ع^2+1)^2$

$\frac{دص}{دع}=2(ع^2+1)\times2ع$

$ع=س^2$

$\frac{دس}{دع}=2س$

عندما $س=1\Leftarrow ع=1^2\Leftarrow ع=1$

$\frac{دص}{دس}=\frac{دص}{دع}\times\frac{دع}{دس}\Leftarrow \frac{دص}{دس}=4ع(ع^2+1)\times2س=4\times2\times2\Big|_{\substack{س=1\\ع=1}}=16$

أ.مي حواري

طريقة (٢):

$ص=(ع^2+1)^2$ نفوض $ع=س^2$

$ص=((س^2)^2+1)^2\Leftarrow ص=(س^4+1)^2\Leftarrow \frac{دص}{دس}=2(س^4+1)\times4س^3\Big|_{س=1}$

$\frac{دص}{دس}\Big|_{س=1}=2(1+1)\times4=2\times2\times4=16$

• 2020 دورثاني/ إذا كان $ق(س)=(س^3+5س+2)^{\frac{3}{4}}$ ، ما قيمة $ق'(2)$

P/ $\frac{27}{4}$ ب/ $\frac{27}{8}$ ج/ $\frac{21}{4}$ د/ $\frac{3}{7}$

الحل/

$ق'(س)=\frac{3}{4}(س^3+5س+2)^{-\frac{1}{4}}(3س^2+5)$

$ق'(2)=\frac{3}{4}(8+10+2)^{-\frac{1}{4}}(12+5)$

$=\frac{3}{4}\times20\times(20)^{-\frac{1}{4}}=\frac{3}{4}\times20\times\frac{1}{(20)^{\frac{1}{4}}}$

$\Leftarrow ق'(2)=\frac{3}{4}\times(\frac{1}{2})^{\frac{1}{4}}=\frac{3}{4}\times2^{-1}=\frac{3}{8}\times\frac{1}{(2^3)^{\frac{1}{4}}}$

$\Leftarrow ق'(2)=\frac{27}{8}$

• 2020 دور ثالث/ إذا كان $ق(س) = \frac{1}{1+س^2}$ ، $ه(س) = ظاس$ ما قيمة $(ق \circ ه)'(\frac{\pi}{4})$

ب/ $-جا(2س)$ ج/ $3جتا(2س)$ د/ $قتاس$

أ/ $2جاس جتاس$

الحل/ $ق(س) = \frac{1}{1+س^2}$ ← $ق'(س) = \frac{-2س}{(1+س^2)^2}$

$ه(س) = ظاس$ ← $ه'(س) = قتاس$

أ.مي حواري

* $(ق \circ ه)'(س) = ق'(ه(س)) \cdot ه'(س)$

$= ق'(ظاس) \times قتاس$

$= \frac{-2ظاس}{(ظتاس+1)^2} \times قتاس = \frac{-2ظاس قتاس}{(قتاس)^2} = \frac{-2ظاس}{قتاس}$

← $(ق \circ ه)'(س) = -2ظاس جتاس = -2 \frac{جاس}{جتاس} \times جتاس = -2جاس جتاس$

$= -جا(2س)$

• 2022 دور ثاني/ إذا كان $ق(س) = \frac{1}{س}$ ، $ه(س) = 6-س$ ما قيمة $(ق \circ ه)'(3)$

ب/ $\frac{1}{9}$ ج/ $\frac{1}{3}$ د/ $\frac{-1}{3}$

أ/ $\frac{-1}{9}$

الحل/

$ق(س) = \frac{1}{س}$ ، $ق(س) = \frac{-1}{س^2}$

$ه(س) = 6-س$ ← $ه(3) = 6-3 = 3$

$ه'(س) = -1$ ← $ه'(3) = -1$

$(ق \circ ه)'(3) = ق'(ه(3)) \cdot ه'(3)$

$= ق'(3) \times -1 = \frac{-1}{3^2} \times -1 = \frac{1}{9}$

• 2022 دور ثالث/ إذا كان $ق(س^2+2س-2) = \sqrt{س+3}$ ، $ه(س) = 2س-3$ ما قيمة $ق'(1)$

ب/ $\frac{1}{8}$ ج/ $\frac{1}{4}$ د/ 1

أ/ $\frac{1}{16}$

الحل/

* عندما $س^2+2س-2 = 1$ ← $س^2+2س-3 = 0$ ← $(س-1)(س+3) = 0$

إما $س-1 = 0$ ← $س = 1$ أو $س+3 = 0$ ← $س = -3$ مرفوض لأن $2س-3$

* $ق(س^2+2س-3) = \sqrt{س+3}$

$ق'(س^2+2س-2)(2س+2) = \frac{1}{2\sqrt{س+3}}$

$س = 1$

$ق'(1+2-2)(2+2) = \frac{1}{4\sqrt{4}}$ ← $ق'(1) \times 4 = \frac{1}{4}$ ← $ق'(1) = \frac{1}{16}$

• 2020 دور ثالث/ إذا كان $ص = لو_هـ(ق(س))$ ، ما قيمة $\frac{د ص}{د س}$

ب/ $\frac{1}{س} ق(لو_هـ س)$ ج/ $ق(\frac{1}{س})$ د/ $ق(لو_هـ س)$

أ/ $\frac{1}{س} ق(س)$

الحل/ $ص = ق(و(س)) \Rightarrow ص' = ق'(و(س)) \times \frac{1}{س}$

• 2020 دورثاني/ إذا كان $ق(س) = (٥-٣س)^{٦}$ و $ق'(س) = ٩٨(٥-٣س)^{٤}$ ما قيمة $و'(٢)$

الثابت م

م/ ٣

ن/ ١ ص/ ١٥ ع/ ١٥-

الحل/ $ق(س) = (٥-٣س)^{٦}$

$ق'(س) = ٦(٥-٣س)^{٥} \times -٣ = -١٨(٥-٣س)^{٥}$

$ق''(س) = -١٨ \times ٥(٥-٣س)^{٤} \times -٣ = ٢٧٠(٥-٣س)^{٤}$

$٩٨(٥-٣س)^{٤} = ٢٧٠(٥-٣س)^{٤}$ بالمقارنة

$م = \frac{٢٧٠}{٩٨} = ١٥ \in ٢٧٠ = ٩٨$

أ.مي حواري

• 2023 دورثاني/ إذا كان $و(س) = \frac{س}{١+س}$ و $و(٢) = ١$ و $ق(٢) = ٨$ ما قيمة $(ق \circ و)'(٢)$

م/ ٣٢ ن/ ٨ ص/ ٣ ع/ ٤

الحل/ $و(س) = \frac{س}{١+س}$ اضافة وطرح (١) للبسط "لتحصيل كمالية او تحقيق"

$و(س) = \frac{١-١+س}{١+س} = \frac{١}{١+س} + \frac{١+س}{١+س} = ١ - \frac{١}{١+س}$

$ق'(س) = ٠ - \frac{-١}{ج(١+س)} = \frac{١}{(١+س)^{٢}}$

$*(ق \circ و)'(٢) = ق'(و(٢))و'(٢) = ق'(١) \times \frac{١}{ج(١+١)} \times ٨ = \frac{٨}{٤} = ٢$

• 2024 دورأول/ إذا كان $ص = \sqrt{٣س+٤}$ و $س = ٣ع - ٢$ جد $\frac{دص}{دع}$ عندما $ع = ٣$

د/ $\frac{٣}{٤}$ ن/ $\frac{٣}{٢}$ ص/ $\frac{١}{٤}$ ع/ $\frac{١}{٢}$

طريقة (١):

$ص = \sqrt{٣س+٤}$

$س = ٣ع - ٢$

$\frac{دص}{دس} = \frac{٣}{٢\sqrt{٣س+٤}}$

$\frac{دس}{دع} = ٣$

• عندما $ع = ٣ \Leftarrow س = ٣ \times ٣ - ٢ = ٧ \Leftarrow ص = ٤$

$\frac{دص}{دع} = \frac{دص}{دس} \times \frac{دس}{دع} \Leftarrow \frac{دص}{دع} = \frac{٣}{٢\sqrt{٣س+٤}} \times ٣ = \frac{٣}{٢\sqrt{٣ \times ٣ + ٤}} = \frac{٣}{٢\sqrt{١٣}}$

طريقة (٢):

نفوض $س = ٣ع - ٢$ $\quad ص = \sqrt{٣س+٤}$

$ص = \sqrt{٣(٣ع-٢)+٤} = \sqrt{٩ع-٦+٤} = \sqrt{٩ع-٢}$

$\frac{دص}{دع} = \frac{٩}{٢\sqrt{٩ع-٢}} = \frac{٩}{٢\sqrt{١٨-٢}} = \frac{٩}{٢\sqrt{١٦}} = \frac{٣}{٤}$

• 2024 دورثاني/ لتكن $(هـ\circ ه)'(٤) = -١٦$ و $هـ(س) = س^{٣}+٣$ و $\text{ق}(٤) = ٤$ ما قيمة $\text{ق}(٤)$

د/ -٤ ج/ ٤ ب/ ٢ أ/ -٢

الحل/ $هـ(س) = س^{٣}+٣ \Leftarrow هـ'(س) = ٣س^{٢} \Leftarrow هـ'(\text{ق}(٤)) = ٣\text{ق}(٤)$

$*\ (هـ\circ ه)'(٤) = هـ'(\text{ق}(٤))\ \text{ق}'(٤)$

$-١٦ = ٣\text{ق}(٤) \times ٤ \Leftarrow \frac{-١٦}{٨} = \frac{٨\text{ق}(٤)}{٨} \Leftarrow \text{ق}(٤) = -٢$

• 2024 دورثالث/ إذا كان $ص = \sqrt[٣]{س^{٤}-٢}$ ما قيمة $\left|\frac{دص}{دس}\right|_{س=١}$

د/ ٢ ج/ ١ ب/ $\frac{٣}{٢}$ أ/ $\frac{٢}{٣}$

الحل/ $ص = (س^{٤}-٢)^{\frac{١}{٣}} \Leftarrow \frac{دص}{دس} = \frac{١}{٣}(س^{٤}-٢)^{-\frac{٢}{٣}} \times ٤س^{٣} = \frac{٤س^{٣}}{٣\sqrt[٣]{(س^{٤}-٢)^{٢}}} = \frac{٤س^{٣}}{٣(س^{٤}-٢)^{\frac{٢}{٣}}}$

$\left|\frac{دص}{دس}\right|_{س=١} = \frac{٤(١)}{٣\sqrt[٣]{(١-٢)^{٢}}} = \frac{٤}{٣\sqrt[٣]{١}} = \frac{٤}{٣}$

• 2025 دورأول/ إذا كان $هـ(س) = س^{٤}-س$ و $\text{ق}(س) = ١-س$ ما قيمة $(هـ\circ ه)'(١)$

د/ صفر ج/ ٢ ب/ -١ أ/ ١

الحل/ $هـ(س) = س^{٤}-س$

$\text{ق}(س) = ١-س$

$(هـ\circ ه)'(١) = هـ'(\text{ق}(١))\ \text{ق}'(١)$

$= هـ'(٠) \times -١ = (٤ \times ٠^{٣}-١) \times -١ = -١ \times -١ = ١$

• 2025 دورأول/ إذا كان $هـ(س) = \frac{س}{\sqrt{٢س+١}}$ و $\text{ق}(س) = ٣س^{٢}-١$ ما قيمة $\text{ق}'(٠)$

د/ $\frac{١}{٢\sqrt{٢}}$ ج/ -١ ب/ ١ أ/ صفر

الحل/ $هـ(س) = \frac{س}{(٢س+١)^{\frac{١}{٢}}} = س \times (٢س+١)^{-\frac{١}{٢}}$

$\text{ق}'(س) = س \times -\frac{١}{٢}(٢س+١)^{-\frac{٣}{٢}} \times ٢ + (٢س+١)^{-\frac{١}{٢}} \times ١$

$\text{ق}'(٠) = ٠ \times -\frac{١}{٢}(١)^{-\frac{٣}{٢}} \times ٢ + (١)^{-\frac{١}{٢}} \times ١ = ١ \times ١ = ١$

أ.مي حواري

• 2025 دورثاني/ إذا كان $\text{ق}(٣س-٢) = ١-س^{٧}$ و ما قيمة $\text{ق}(٥)$

د/ -٢ ج/ ٧ ب/ ١ أ/ -١

الحل/ $*\ ٣س-٢ = ٥ \Leftarrow ٣س = ٧ \Leftarrow س = ١$

$\text{ق}(٣س-٢) = ١-س^{٧} \Leftarrow \text{ق}'(٣س-٢) \times ٣ = -٧س^{٦}$

$\text{ق}'(٣-٢) = -(١)^{٦} \Leftarrow \text{ق}'(٥) = -١$

• 2025 دورتان/ اذا كان $ق(س) = لو_{هـ} ك(س) - لو_{هـ}(هـ^{س} + س)$ و $ك'(1) = 3$ و $ق'(1)$ ما قيمة

ب/ $\frac{1}{2}$ — ج/ 1 — د/ $\frac{1}{1+هـ}$ — أ/ $3 - لو_{هـ} 2$

الحل/ $ق(س) = لو_{هـ} ك(س) - لو_{هـ}(هـ^{س} + س)$ ← $ق(س) = ك(س) - لو_{هـ}(هـ^{س} + س)$

$ق'(س) = ك'(س) - \frac{هـ^{س} + 1}{هـ^{س} + س}$ ← $ق'(1) = ك'(1) - \frac{هـ^{1} + 1}{هـ^{1} + 1} = 3 - \frac{1+1}{1}$

$ق'(1) = 3 - 2 = 1$

• 2024 نابلس/ إذا كان $ق(س) = س^{3} + 5س + 4$ و $ق(4) = 2$ و $ك(4) = 3$ وكان $(ق \circ ك)'(4) = 21$ و ما قيمة الثابت ب

أ/ 3 — ب/ 17 — ج/ -1 — د/ 5

الحل/ $ق(س) = س^{3} + 5س + 4$ ← $ق'(س) = 3س^{2} + 5$

$(ق \circ ك)'(4) = ق'(ك(4)) \cdot ك'(4)$

$21 = \frac{ق'(2)}{3} \times ب$ ← $ق'(2) = 3 \times 2^{2} + 5 = 17$ ← $ب = 21$

← $ب = 3$

أ.مي حواري

• خارجي/ ليكن $(ق \circ ك)'(3) = \frac{8}{27}$ و $ك(س) = \frac{ب}{س}$ و $ق(س) = س^{3}$ ما قيمة الثابت ب

أ/ 3 — ب/ 27 — ج/ -8 — د/ -2

الحل/ $ق(س) = س^{3}$ ← $ق'(س) = 3س^{2}$

$ك(س) = \frac{ب}{س}$ ← $ك'(3) = \frac{ب}{3}$

$ك'(س) = \frac{-ب}{س^{2}}$ ← $ك'(3) = \frac{-ب}{3^{2}} = \frac{-ب}{9}$

$(ق \circ ك)'(3) = ق'(ك(3)) \cdot ك'(3)$

$\frac{8}{27} = ق'(\frac{ب}{3}) \times \frac{-ب}{9}$ ← $\frac{8}{3} = 3(\frac{ب}{3})^{2} \times -ب$

← $\frac{8}{3} = \frac{3 \times ب^{2}}{9} \times -ب$ ← $-8 = ب^{3}$ ← $ب = \sqrt[3]{-8} = -2$

• خارجي/ إذا كان $ص = \sqrt{8ع}$ و $س = ظاس$ جد $\frac{دص}{دس}$ عندما $ص = 2$ علماً بأن $س \in [0, \frac{\pi}{4}]$

أ/ 1 — ب/ 2 — ج/ 5 — د/ -2

الحل/ $ص = \sqrt{8ع} = \sqrt{8} \times \sqrt{ظاس} = \sqrt{8ظاس}$ ← $ص = \sqrt{8} \times$ احاس (+) في الربع الأول

$ص = \sqrt{2} \sqrt{ظاس}$ / عندما $ص = 2$ ← $2 = \sqrt{2}\sqrt{ظاس}$ ← $ظاس = 1$

← $س = \frac{\pi}{4}$ ∈ $[0, \frac{\pi}{4}]$

$\frac{دص}{دس} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{ظاس}} \times قا^{2}س$ ← $\frac{دص}{دس}$ عندما $س = \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{1}} \times (\sqrt{2})^{2} = 2$

• خارجي/ إذا كان $\frac{ع}{س}(ه(ع)) = ٢ع^{٥} + ٦ع^{٣}$ ، $س = ٢ع + ٦$ فأوجد $ه'(س)$

أ/ $٥س^{\frac{٣}{٢}} + ٩\sqrt{س}$

ب/ $ع^{٤} + ٦س$

الحل/ $\frac{ع}{س}(ه(ع)) = ٢ع^{٥} + ٦ع^{٣}$

$ه'(ع) \times \frac{٣س}{٣س} = \frac{٢ع^{٥}}{٣س} + \frac{٦ع^{٣}}{٣س}$ ، $٦ \neq ٣س$ ∴

$ه'(ع) = ٣ع^{٤} + ٣ع^{٢}$

نفرض $ع = ص$

$ه'(ع) = (ع)^{٢} + ٣(ع)^{٢}$

$ه'(ص) = ص^{٤} + ٣ص^{٢}$

$ه'(س) = س^{٤} + ٣س^{٢}$

$ه'(س) = ٥س^{٤} + ٣س^{٢}$

$ه'(س) = ٥س^{٣} + ٩س^{٢}$

أ.مي حواري

• القسم الثاني/ أجب عن الأسئلة التالية

• 2017 دور أول/ إذا كان المماس لمنحنى $ه(س) = (\frac{٢}{س} + ٣س)^{٢}$ عند $س = ١$ يمر بالنقطة $(٥، ٩)$ جد قيمة الثابت $م$

الحل/ $ه(١) = (\frac{٢}{م} + ٣)^{٢} = ٥^{٢} = ٢٥$ ⇐ $(١، ٢٥)$ نقطة التماس

$ه'(س) = ٢(\frac{٢}{س} + ٣س)(\frac{-٢}{س^{٢}} + ٣)$

ميل المماس $= ه'(١) = ٢(\frac{٢}{م} + ٣)(-٢ + ٣) = ١ \times ٥ \times ٢ = ١٠$

$(١، ٢٥)$ $(٥، ٩)$

ميل المماس $= \frac{ص_{٢} - ص_{١}}{س_{٢} - س_{١}} = \frac{٢٥ - ٥}{١ - ٩} = ١٠$ ⇐ $\frac{٢٠-}{١ - ٩} = ١٠$ ⇐ $٢- = ١ - ٩$ ⇐

$٩ = ١ -$ ⇐

• 2019 دور ثاني/ إذا كان $ص = ل^{٤} - ٢ل + ١$ ، $س = ١ - ٣ل$ جد $\frac{دص}{دس}$ عندما $س = ١$

الحل/ $ص = ل^{٤} - ٢ل + ١$ ، $ل = ١ - س٣$

$\frac{دص}{دل} = ٤ل^{٣} - ٢$ ، $\frac{دل}{دس} = ٣-$

* عندما $س = ١$ ⇐ $ل = ١ - ١ \times ٣ = ٢-$

$\frac{دص}{دس} = \frac{دص}{دل} \times \frac{دل}{دس}$ ⇐ $\frac{دص}{دس} = ٣ \times (٤ل^{٣} - ٢) \Big|_{ل=٢-} = ٣ \times (٤ \times ٨- - ٢) = ٣ \times ٣٠ = ٩٠$

• 2020 دور ثاني/ أوجد $\frac{دص}{دس}$ عندما $ص = ظا^{٣}(ع - ١)$

الحل/ $ص = ظا^{٣}(ع - ١)$

$\frac{دص}{دس} = ٣ ظا^{٢}(ع - ١) \times -ظا(ع - ١)^{٢} \times ٢ \times ٣س$

$= -١٢ ظا^{٢}(ع - ١) ظا(ع - ١) \times س \times (ع - ١)$

• 2020 دورثاني/ إذا كان الاقترانان هـ(س) = $\frac{ب}{س}$ ، ق(س) = $س^{٤}-٢$ وكان $(هـ \circ ق)'(١) = ٢$
ما قيمة الثابت ب

الحل/ $هـ(س) = \frac{ب}{س}$ ، $ق(س) = س^{٤}-٢$

$هـ'(س) = \frac{-ب}{س^{٢}}$ ، $ق'(س) = ٤س^{٣}$ ، $ق'(١) = ٤ \times ١ = ٤$

$*(هـ \circ ق)'(١) = هـ'(ق(١)) ق'(١)$

$٢ = هـ'(٢) \times ٤$ ⟵ $١ = هـ'(٢)$ ⟵ $١ = \frac{-ب}{٤}$ ⟵ $ب = -٤$

• 2020 دورثاني/ إذا كان هـ(س) قابلاً للاشتقاق ، $٢هـ(٢) = ٣ق(٣) = ٨$ ، $ق(٢) = ١٥$
أوجد $\lim_{س \to ٢} \frac{(هـ \circ ق)(س) - هـ(ق(٢))}{س^{٣}+س-٦}$

الحل/ $\lim_{س \to ٢} \frac{هـ(ق(س)) - هـ(ق(٢))}{س^{٣}+س-٦} = \frac{هـ(ق(٢)) - هـ(ق(٢))}{٢^{٣}+٢-٦} = \frac{٠}{٤}$

باستخدام لوبتال/

$\lim_{س \to ٢} \frac{هـ'(ق(س)) ق'(س)}{٣س^{٢}+١} = \frac{هـ'(ق(٢)) ق'(٢)}{٣ \times ٢^{٢}+١} = \frac{هـ'(٣) \times ١٥}{١٣} = \frac{٥ \times ٣}{١٣}$

$= ٣ \times ٣ = ٩$

• ملاحظة/ $٢هـ(٢) = ٨ \Leftarrow هـ(٢) = ٤$ / $٣ق(٣) = ٨ \Leftarrow ق(٣) = ٢$

• 2020 دورثالث/ أوجد $\frac{ص}{س}$ بدلالة المعلمة :

أ.مي حواري

$ص = ع^{٣}-٢ع$ ، $س = ع+٤ = ظا(٣س)$ عندما $س = ٠$

الحل/ $ص = ع^{٣}-٢ع$ ، $ع = ٤+ظا(٣س)$

$\frac{دص}{دع} = ٣ع^{٢}-٢$ ، $\frac{دع}{دس} = ٣ق^{٢}(٣س) \times ٣$

$\frac{ص}{س} = \frac{دص}{دع} \times \frac{دع}{دس} = (٣ع^{٢}-٢) \times ٣ق^{٢}(٣س)$

* عندما $س = ٠ \Leftarrow ع = ٤+ظا(٠) = ٤+٠ = ٤$

$\frac{ص}{س}\Big|_{س=٠} = (٣ \times ٤^{٢}-٢) \times ٣ \times ق^{٢}(٠) = ٤٦ \times ٣ \times ١ = ١٢$

• 2021 دورثاني/ لتكن هـ(س) = $\frac{-٢}{س^{٢}-٢}$ ، ل(س) = لوس ، ما قيمة $(هـ \circ ل)'(هـ)$
الحل/

$هـ(س) = \frac{-٢}{س^{٢}-٢} \Rightarrow هـ'(س) = \frac{+٢ \times ٢س}{(س^{٢}-٢)^{٢}} = \frac{٤س}{(س^{٢}-٢)^{٢}}$

أ.مي حواري

ل(س) = لو$_{هـ}$ س^{٤} = ٤ لو$_{هـ}$ س ⇐ ل'(س) = $\frac{٤}{س}$

* ل(هـ) = ٤ لو$_{هـ}$ هـ = ٤ × ١ = ٤ ⁄ ل'(هـ) = $\frac{٤}{هـ}$

المطلب/ (ق∘ل)'(هـ) = ق'(ل(هـ)) ل'(هـ) = ق'(٤) × $\frac{٤}{هـ}$

= $\frac{٤}{(٤-٢)^{٢}}$ × $\frac{٤}{هـ}$ = $\frac{٤}{٣ × ٤ × ٢}$ = $\frac{هـ}{٣}$

ل(٢)	ل'(٢)	ق'(٢)
٢	-٣	٤

• 2021 دور أول/ إذا كان ق(س) = س ل(س^{٤} + ١) احسب مع الصعود لإيجاد قيمة ق'(١)

الحل/ ق(س) = س ل(س^{٤} + ١)

ق'(س) = س ل'(س^{٤} + ١) × ٤س^{٣} + ل(س^{٤} + ١) × ١

⇐ ق'(س) = ٤س^{٤} ل'(س^{٤} + ١) + ل(س^{٤} + ١)

ق'(س) = ٤س^{٤} ل'(س^{٤} + ١) × ٤س^{٣} + ل'(س^{٤} + ١) × ٤س^{٣} .

ق'(١) = ٤ ل'(٢) × ٤ + ٤ ل'(٢) + ٤ ل'(٢)

= ٦٤ + ٤ × -٣ + ٤ × ٤ = ٦٤ - ١٢ + ١٦ = ٦٠ ⇐ -٢

• 2021 دور أول/ إذا كان ق(س) = ٣س $\sqrt{س^{٤} + ٥}$ فاوجد قيمة ق'(٢)

الحل/ ق'(س) = ٣س × $\frac{٤س^{٣}}{٢\sqrt{س^{٤} + ٥}}$ + $\sqrt{س^{٤} + ٥}$ × ٣

ق'(٢) = $\frac{٣ × ٢ × ٤}{٢\sqrt{٢^{٤} + ٥}}$ + ٣$\sqrt{٢^{٤} + ٥}$ = $\frac{٤ × ٣}{٣}$ + ٣ × ٣

⇐ ق'(٢) = ٤ + ٩ = ١٣

• 2021 دور ثاني/ إذا كان ل(س) = ق^{٣}(س) - ق(س^{٣}) حيث ل'(١) تحقق بأن ق(١) = ٢ ق'(١) = -٤

الحل/ ق(١) = -٤ / ٢ ق'(١) = -٤ ⇐ ق'(١) = -٢

ل(س) = ق^{٣}(س) - ق(س^{٣})

ل'(س) = ٣ ق^{٢}(س) ق'(س) - ق'(س^{٣}) × ٣س^{٢}

ل'(١) = ٣ ق^{٢}(١) ق'(١) - ٣ ق'(١) = ٣ × (-٤)^{٢} × -٢ - ٣ × -٢

⇐ ل'(١) = -٩٦ + ٦ = -٩٦ + ٦ = -٩٠

• 2021 دور ثاني/ إذا كان ص = $\frac{١}{٤}$ ع^{٤} - ٤ و ع = ٤س + ١ أوجد $\frac{ص}{س}$ عندما س = -١

الحل/ ص = $\frac{١}{٤}$ ع^{٤} - ٤

$\frac{ص}{ع}$ = ع^{٣} + ٤

ع = ٤س + ١

$\frac{ع}{س}$ = ٤

عندما $س=-1 \Leftarrow ع=(-1)^2+1=1+1=2$

$\frac{ص}{س}=\frac{ص}{ع}\times\frac{ع}{س} \Leftarrow \frac{ص}{س}=(\frac{1}{ع^2}+ع^2)\times 3س^2 \Big|_{\substack{س=-1\\ع=2}}$

$\frac{ص}{س}=\frac{ص}{س}=(\frac{1}{2^2}\times 2\times 1-)(3+\frac{1}{2})\times 2-=-8+\frac{1}{2}=-7.5$

• 2022 دور أول / إذا كان $هـ(س)=ق(س)+ل(س^3)+3$ حيث $قَ(1)=12$

$ل(1)=ث$ ، $قَ(1)=-6$ ، $ق(1)=2$:

الحل / $*\ هـ(س)=ق(س)+ل(ع^3)+3 \Big|_{س=1}$

$هـ(1)=ق(1)+ل(1)+3 \Leftarrow 12=ق(1)+3 \Leftarrow ق(1)=9$

$هـ(1)=3$ ✓ أو $هـ(1)=-3$ مرفوض لأن $ق(1)>0$:

$*\ هـ(س)=ق(س)+ل(ع^3)+3$

$قَ(س)=2ق(س)قَ(س)+ل(ع^3)\times 3س^2$

$قَ(1)=2ق(1)قَ(1)+ل(1)\times 3\times 2-6+2\times 3-$

$=-36-6=-42$

• 2022 دور ثاني / إذا كان $ل(س)=(هـ(س)-ع^3)^3$ وكان $قَ(1)=-3$ ، $ل(1)=27$

ما قيمة $ل(1)$

الحل / $ل(س)=(هـ(س)-ع^3)^3 \Leftarrow ل(1)=(هـ(1)-1)^3 \Leftarrow 27=(هـ(1)-1)^3$

$\Leftarrow 3=هـ(1)-1 \Leftarrow هـ(1)=4$

$*\ ل(س)=(هـ(س)-ع^3)^3$

$لَ(س)=3(هـ(س)-ع^3)^2(قَ(س)-3س^2)$

$لَ(1)=3(هـ(1)-1)^2(قَ(1)-3)$

$=3(4-1)^2(-3-2)=3\times 9\times 5-=135-$

أ.مي حواري

• 2022 دور ثاني / إذا كان $ص=ظاس+\frac{1}{3}ظا^3س$ أثبت أن $\frac{صَ}{ص}=ع ظاس$

الحل /

$صَ=قا^2س+\frac{3}{3}ظا^2س\times قاس$ اخراج $قاس$ عامل مشترك .

$صَ=قاس(ظاس+1)=قاس\times قا^2س$

$صَ=قا^3س$

$صَّ=3قا^2س\times قاس ظاس$

$\frac{صَّ}{صَ}=\frac{3قا^2س ظاس}{قا^3س}=3ظاس$ #

• 2022 دور ثالث/ إذا كان $هـ(س) = ظا س$ ، $ك(س) = س^٤ - ٤$ ما قيمة $(هـ \circ ك)'(٢)$

الحل/ $هـ(س) = ظا س$ ، $ك(س) = س^٤ - ٤ \leftarrow ك(٢) = ٢^٤ - ٤ = ١٢$

$هـ'(س) = قا^٢ س$ ، $ك'(س) = ٤س^٣ \leftarrow ك'(٢) = ٤ \times ٢^٣ = ٣٢$

$(هـ \circ ك)'(٢) = هـ'(ك(٢)) \cdot ك'(٢) = هـ'(١٢) \times ٣٢$

$= قا^٢(١٢) \times ٣٢ = ١ \times ٣٢ = ٣٢$

• 2023 دور أول/ إذا كان $ص = ٢ع^٢ - ١$ ، $ع = س^٢ + ١$ حيث الثابت ٢ إذا علمت أن $\frac{ص}{س} = ٣٢$ عندما $س = ١$

الحل/ $ص = ٢ع^٢ - ١$ ، $ع = س^٢ + ١$

$\frac{ص}{س} = ٢ع \frac{ع}{س}$ ، $\frac{ع}{س} = ٢س$

* عندما $س = ١ \leftarrow ع = ١ + ١ = ٢$

$\frac{ص}{س} = \frac{ص}{ع} \times \frac{ع}{س} \leftarrow \frac{ص}{س} = ٢ع \times ٢س \Big|_{\substack{ع=٢ \\ س=١}} \leftarrow ٣٢ = ٢ \times ٢ \times ٤$

$\leftarrow \frac{٣٢}{٨} = \frac{٨ل}{٨} \leftarrow ل = ٤$

• 2023 دور ثاني/ إذا كان $ص = ع^٥ - ٥ع$ ، $س = ع^٣ - ١$ فما قيمة $\frac{ص}{س}$ عندما $س = ٥$

الحل/ $ص = ع^٥ - ٥ع$

$\frac{ص}{ع} = ٥ع^٤ - ٥$

$س = ع^٣ - ١$

$\frac{س}{ع} = ٣ع^٢$

عندما $س = ٥ \leftarrow ع^٣ - ١ = ٥ \leftarrow ع^٣ = ٦ \leftarrow ع = ٢$

$\frac{ص}{س} = \frac{ص}{ع} \times \frac{ع}{س} \leftarrow \frac{ص}{س} = (٥ع^٤ - ٥) \times \frac{١}{٣ع^٢} \Big|_{ع=٢} = (٥ \times ٢^٤ - ٥) \times \frac{١}{٣ \times ٢^٢} = \frac{١٥}{١٢}$

• 2023 دور ثاني/ إذا كان $ص = ٢جا(٣س) - ٥ظا(٣س)$ وأثبت أن

$(ص')^٢ + ٤ص^٢ = ٤ل^٢ + ٤ن^٢$

الحل/ $ص = ٢جا(٣س) - ٥ظا(٣س)$

$ص' = ٦جتا(٣س) + ١٥قا^٢(٣س)$

$(ص')^٢ = (٦جتا(٣س) + ١٥قا^٢(٣س))^٢$

$\leftarrow (ص')^٢ = ٣٦جتا^٢(٣س) + ٢ \times ٦ \times ١٥ جتا(٣س) قا^٢(٣س) + ٢٢٥قا^٤(٣س)$

$\leftarrow (ص')^٢ = ٤ \times ٩جتا^٢(٣س) + ٨ \times ٩ جا(٣س) قا^٣(٣س) + ٢٢٥قا^٤(٣س)$

* $ص = ٢جا(٣س) - ٥ظا(٣س) \leftarrow (ص)^٢ = (٢جا(٣س) - ٥ظا(٣س))^٢$

$ص^٢ = ٤جا^٢(٣س) - ٢٠جا(٣س) ظا(٣س) + ٢٥ظا^٢(٣س)$

$٤ص^٢ = ١٦جا^٢(٣س) - ٨٠ جا(٣س) قا(٣س) + ١٠٠ظا^٢(٣س)$

أ.مي حواري

$(ص')^2 + 3ص^2 = 3د^2 ضتا^2(2س) + 18ب ضتا(2س) جا(2س) + 3ب^2 جا^2(2س) + 3د^2 جا^2(2س) - 18ب جا(2س) ضتا(2س)$
$+ 3ب^2 ضتا^2(2س)$

$\Leftarrow (ص')^2 + 3ص^2 = 3د^2 (ضتا^2(2س) + جا^2(2س)) + 3ب^2 (جا^2(2س) + ضتا^2(2س))$
$= 3د^2(1) + 3ب^2(1) = 3د^2 + 3ب^2$ #

• 2024 دورأول/ إذا كان $ق(س) = س^3 + 3س - 2$ و $ه(س) = 2س$ و $(ق \circ ه)'(2) = 18$ ما قيمة الثابت $د$

الحل/ $ق(س) = س^3 + 3س - 2$
$ق'(س) = 3س^2 + 3$
$ق'(س) = 6س$
$ه(س) = 2س \Leftarrow ه(2) = 4$
$(ق \circ ه)'(2) = ق'(ه(2)) ه'(2)$
$18 = ق'(4) \times 2 \Leftarrow 18 = \frac{د}{48} \times 24$
$\Leftarrow 3د = 18 \Leftarrow د = 6$

أ.مي حواري

• 2024 دورثاني/ إذا كان $ق(س) = \frac{ل(س^3+1)}{س}$ و $ق'(1)$ علماً بأن $ل(2) = 5$، $ل'(2) = -1$

الحل/
$ق'(س) = \frac{س ل'(س^3+1) \times 3س^2 - ل(س^3+1)}{س^2} \Leftarrow ق'(1) = \frac{ل'(2) - ل(2)}{(1)^2}$
$\Leftarrow ق'(1) = 3 \times (-1) - 5 = -3 - 5 = -8$

• 2024 دورثالث/ اذا كان $ص = ع^3 + 3ع$ و $س = \frac{ع+1}{ع-1}$ و $ع \neq 1$ فجد $\frac{دص}{دس}$ عندما $س = 0$

الحل/ $ص = ع^3 + 3ع$
$\frac{دص}{دع} = 3ع^2 + 3$
$\frac{دس}{دع} = \frac{(ع-1) - (ع+1)}{(ع-1)^2} = \frac{-2}{(ع-1)^2}$
$\Leftarrow \frac{دص}{دس} = \frac{دص}{دع} \times \frac{دع}{دس} = 3(ع^2+1) \times \frac{(ع-1)^2}{-2}$
عندما $س = 0 \Leftarrow ع = -1$
عندما $ع = -1$ فإن $\frac{دص}{دس} = 3(2) \times \frac{4}{-2} = -12$

• 2025 دورتان/ إذا كان ص = ق(هـ(س/ب)) وكانت ص|س=1 = 2 ، ق(1/ب) = 1/2

هـ(1/ب) = -1 ، ق(1/2) = 2 ما قيمة الثابت ب

الحل/ ص = ق(هـ(س/ب)) ⇐ ص' = ق'(هـ(س/ب)) هـ'(س/ب) × 1/ب

ص'|س=1 = ق'(هـ(1/ب)) هـ'(1/ب) × 1/ب

⇐ 2 = ق'(-1) × 1/ب ⇐ 2 = 2 × -1 × 1/ب ⇐ 1+ = -1/ب ⇐ ب = -1

• 2025 شمال الخليل/ إذا كان ق(س) = 1 - هـ^س ، ع(س) = س^3 - س ، جد (ق∘ع)'(1)

الحل/ ق(س) = 1 - هـ^س

ق'(س) = - هـ^س

ع'(س) = 3س^2 - 1 ⇐ ع'(1) = 3 - 1 = 2

ع(س) = س^3 - س ⇐ ع(1) = 1 - 1 = 0

(ق∘ع)'(1) = ق'(ع(1)) ع'(1)

= ق'(0) × 2 = - هـ^0 × 2 = -1 × 2 = -2

أ.مي حواري

• خارجي/ إذا كان م(س) = جا(3س) + ب جتا(3س) ، ب ≠ 0 وكان م'(س) = -م(س)

ما قيمة/ قيم الثابت ب

الحل/ م'(س) = جتا(3س) × 3 - ب جا(3س)

م''(س) = -جا(3س) × 9 - 3ب جتا(3س)

⇐ م''(س) = -م(س) ⇐ -جا(3س) - 3ب جتا(3س) = -جا(3س) + ب جتا(3س)

⇐ -9 = -3ب ⇐ ب = 3 ، ب = -1

• خارجي تفوق/ إذا كان ع = (ص+1)/(ص-1) ، ص = (س+4)/(س-2) أثبت أن ع'(س)/ع'(س) = 1/3

الحل/

ع = (ص+1)/(ص-1) نفوض ص = (س+4)/(س-2)

ع = (1 + (س+4)/(س-2)) ÷ (1 - (س+4)/(س-2)) (توحيد مقامات)

ع = ((س-2+س+4)/(س-2)) ÷ ((س-2-س-4)/(س-2)) = (2س+2)/(-6) × (س-2)/(س-2)

ع = 1/3 س + 1/3 ⇐ ع'(س) = 1/3 ⇐ ع'(س)/ع'(س) = 1/3

• خارجي تفوهد/ إذا كان $-٤ق'(٢) = ٣$ هـ$(٢) = ١٢$ ، $٣ق'(٤) = ١٤$ أوجد قيمة $\lim_{س \to ٢} \left(\frac{(هـ \circ هـ)(س) - هـ(هـ(٢))}{س^٤ + س - ٦} \right)$

الحل/ $-٤ق'(٢) = ١٢ \Leftarrow ق'(٢) = -٣$ / $٣هـ(٢) = ١٢ \Leftarrow هـ(٢) = ٤$

$٣ق'(٤) = ١٤ \Leftarrow ق'(٤) = ٧$

$$\lim_{س \to ٢} \frac{هـ(هـ(س)) - هـ(هـ(٢))}{س^٤ + س - ٦} = \frac{هـ(هـ(٢)) - هـ(هـ(٢))}{٢^٤ + ٢ - ٦} = \frac{ب}{ب}$$

باستخدام لوبتال/ $$\lim_{س \to ٢} \frac{ق'(هـ(س)) \, ق'(س)}{٤س^٣ + ١} = \frac{ق'(هـ(٢)) \, ق'(٢)}{٤ \times ٢^٣ + ١} = \frac{ق'(٤) \times -٣}{٥} = \frac{٧ \times -٣}{٥}$$

$$= \frac{-٢١}{٥}$$

أ.مي حواري

وما ضيرك إن لم يعلم عن تفاصيلك أحد، ألا يكفيك أنك تجتهد؟
ألا يغنيك أنك تحاول؟ ألا تؤمن أن الله يعلم! إذا دع عنك
انشغالاً بالآخرين وانشغل بك، استمتع برحلتك، لا تدري متى

الوحدة الثانية | تطبيقات التفاضل
" الاقترانات المتزايدة والمتناقصة "

• القسم الأول | اختر الإجابة الصحيحة

• 2019 دور أول/ إذا كان $ق(س) = هـ^{س} - س$ ، $س \in [0 ، \infty[$ فما مجال تزايد $ق(س)$

ب/ $[0 ، \infty[$ ج/ $]-\infty ، 0]$ د/ $]0 ، \infty[$


الحل/ $ق(س) = هـ^{س} - س$ متصل على $ح$ حاصل طرح متصلين $(هـ^{س}$ و $ح)$

$ق'(س) = هـ^{س} - 1 = 0 \Leftarrow هـ^{س} = 1 \Leftarrow س = 0$ ، الأساسان متساويان فالأسس متساوية

$س = 0$

إشارة $ق'(س)$ من $-\infty$ إلى 0 سالبة، ومن 0 إلى ∞ موجبة

$ق(س)$ متزايد على $[0 ، \infty[$



• 2019 دور ثاني/ إذا كان $ق(س) = س - 2جاس$ ، $س \in [0 ، \frac{\pi}{2}]$ فما مجال تناقص $ق(س)$

ب/ $[0 ، \frac{\pi}{3}]$ ج/ $[\frac{\pi}{3} ، \frac{\pi}{2}]$ د/ $]0 ، \frac{\pi}{3}[$


الحل/ $ق(س) = س - 2جاس$ متصل على $[0 ، \frac{\pi}{2}]$ حاصل طرح متصلين $(ح(س) = س$ و $ل(س) = 2جاس)$

$ق'(س) = 1 - 2جتاس = 0 \Leftarrow 2جتاس = 1 \Leftarrow جتاس = \frac{1}{2}$

$\Leftarrow س = \frac{\pi}{3} \in]0 ، \frac{\pi}{2}[$

إشارة $ق'(س)$:

$ق(س)$ متناقص على $[0 ، \frac{\pi}{3}]$



أ.مي حواري

• 2020 دور أول/ إذا كان $ق(س) = \frac{س}{1+س}$ ، $س \neq -1$ فالعبارة الصحيحة فيما يلي:

ب/ $ق(س)$ متزايد على $ح$

ج/ $ق(س)$ متناقص على $ح$


د/ $ق(س)$ متزايد على $]-\infty ، -1[\cup]-1 ، \infty[$

هـ/ $ق(س)$ متناقص على $]-\infty ، -1[\cup]-1 ، \infty[$

الحل/ $ق(س) = \frac{س}{1+س} = \frac{1+س-1}{1+س}$ لتسهيل عملية الاشتقاق

$ق(س) = \frac{1+س}{1+س} - \frac{1}{1+س} = 1 - \frac{1}{1+س}$

$ق'(س) = \frac{1}{(1+س)^{2}} \neq 0$




• 2020 دور ثاني/ إذا كان $ق(س) = \ln س$ فما المجال الذي تكون فيه $ق(س)$ متزايد

ب/ $]0 ، \infty[$ ج/ $]2 ، \infty[$ د/ $]-\infty ، 2[$

الحل/ أولاً/ نجد مجال $ق(س)$: $\ln$ مجاله $س > 0$

$ق'(س) = \frac{1}{س} \neq 0$

$\Leftarrow ق(س)$ متزايد على $]0 ، \infty[$



• 2021 دور أول / إذا كان $ق(س) = ه^{س} - ه^{-س}$ وما العبارة الصحيحة فيما يلي :

أ/ ق متزايد على $]-\infty, \infty[$ ب/ ق متزايد على $]-\infty, 0]$ متناقص على $[0, \infty[$

ج/ ق متناقص على $]-\infty, 0]$ متزايد على $[0, \infty[$ د/ ق متناقص على $]-\infty, \infty[$


الحل / $ق(س) = ه^{س} - ه^{-س}$ متصل على ح

$ق'(س) = ه^{س} + ه^{-س} \neq 0$

$ق'(س) = ه^{س} + \frac{1}{ه^{س}}$

موجب + موجب $\neq$ صفر

إشارة $ق'$ / $ق(س)$ متزايد على ح



• 2021 دور ثاني / إذا كان $ق(س) = (س^{3}-1)^{3}(س-2)^{4}$ ما المجال الذي يكون فيه $ق(س)$ متناقصاً

أ/ $]-\infty, 2]$ ب/ $]-\infty, -1]$ ج/ $[-1, 2]$ د/ $[1, 2]$

الحل / $ق(س) = (س^{3}-1)^{3}(س-2)^{4} = 0$


إما $س^{3}-1 = 0 \Leftarrow س^{3} = 1 \Leftarrow س = 1$

أو $س-2 = 0 \Leftarrow س = 2$

$س = -1$

من اشارة $ق(س)$:

$ق(س)$ متناقص على $[-1, 1]$



• 2022 دور أول / إذا كان $ق(س) = 3س^{4} - س^{5} - 5$ ما المجال الذي يكون فيه $ق(س)$ متزايداً

أ/ $]-\infty, 2]$ ب/ $]-\infty, 0]$ ج/ $[-1, 1]$ د/ $[0, 2]$

الحل / $ق(س) = 3س^{4} - س^{5} - 5$ متصل على ح لأنه كثير حدود


$ق'(س) = 12س^{3} - 5س^{4}$

$= س^{3}(12 - 5س)$

إما $س^{3} = 0 \Leftarrow س = 0$ أو $12 - 5س = 0 \Leftarrow س = \frac{12}{5} = 2$

من اشارة $ق'(س)$:

$ق(س)$ متزايد على $[0, 2]$



• 2022 دور ثاني / إذا كان $ق(س) = س^{3} + 12س - 24$ ما العبارة الصحيحة فيما يلي :

أ/ $ق(س)$ متزايد على ح ب/ $ق(س)$ متزايد على $]-\infty, -2[\cup]2, \infty[$

ج/ $ق(س)$ متناقص على ح د/ $ق(س)$ متناقص على $[-2, 2]$


الحل / $ق(س) = س^{3} + 12س - 24$ كثير حدود متصل على ح

$ق'(س) = 3س^{2} + 12 = 0$

$3س^{2} = -12 \Leftarrow س^{2} = -4$ X

من اشارة $ق'(س)$ /

$ق(س)$ متزايد على ح.



• 2023 دور أول/ اذا كان $ه(س)$ متزايد على $ح$ و $ك(س) = (س^2 - 4)\, ق(س^3 - 4س)$


ما الفترة الذي يكون فيها $ك(س)$ متناقصاً :

أ/ $]-\infty, 2[$ ب/ $]0, 4[$ ج/ $]-\infty, 0[$ د/ $]4, \infty[$

الحل/ $ه(س)$ متزايد على $ح \Leftarrow ق(س) > 0$ على $ح$

$\therefore ك'(س) = (س^2 - 4)\, ق(س^3 - 4س) = 0$

إما $س^2 - 4 = 0 \Leftarrow س^2 = 4 \Leftarrow س = 2$ أو $ق(س^3 - 4س) = 0$ حيث $ق(س) > 0$



$\therefore ك'(س) < 0$ على $]-\infty, 2[$

$\Leftarrow ك(س)$ متناقص على $]-\infty, 2[$

• 2025 صيف نابلس/ إذا كان $ه(س)$ اقتران كثير حدود ومتزايد على $[-4, -2]$ ويقع في الربع الثاني

وكان $ك(س) = \frac{س}{ه(س)}$ ، أي العبارات التالية صحيحة :

أ/ $ه(س)$ متناقص على $[-4, -2]$ ب/ $ه(س)$ متناقص على $]-4, -2[$

ج/ $ه(س)$ متزايد على $ح$. د/ $ك(س)$ متزايد على $[-4, -2]$

الحل/ $ه(س)$ متزايد على $[-4, -2] \Leftarrow ق(س) > 0$ على $]-4, -2[$

$ه(س)$ يقع في الربع الثاني $\Leftarrow ه(س) > 0$

$ك(س) = \frac{س}{ه(س)}$ متصل على $[-4, -2]$ حاصل قسمة متصلين $\neq$ صفر $\because$

$ق(س) = \frac{ه(س) \times 1 - س\, ق(س)}{ه^2(س)} = \frac{(موجب) - (سالب)(موجب)}{موجب} = \frac{موجب + موجب}{موجب}$

$\Leftarrow$ و $س \in [-4, -2]$


$\therefore ق(س) > 0$ في $]-4, -2[\Leftarrow ك(س)$ متزايد على $[-4, -2]$

• القسم الثاني | أجب عن الأسئلة التالية :

• 2019 دور أول/ عين مجالات التزايد والتناقص للاقتران $ه(س) = س^3 - 3س^2 + 3س + 2$

الحل/ $ه(س) = س^3 - 3س^2 + 2$ متصل على $ح$ لأنه كثير حدود .

$ق(س) = 3س^2 - 3$



$س = 1$ أو $س = -1$

من إشارة $ق(س)$:

$ه(س)$ متزايد على $]-\infty, -1] \cup [1, \infty[$

$ه(س)$ متناقص على $[-1, 1]$

أ.مي حواري

• 2019 دور ثاني / عين فترات التزايد والتناقص للاقتران $ق(س) = ك س^3 - 2ك س^2 + 6س + 29$

الحل / $ق(س) = 3ك س^2 - 2ك س$ متصل على $ح$ لأنه حاصل طرح متصلين $ك$ ،،


$ق(س) = 3ك س^2 - 2ك س = 0$ ∴ اخراج $2ك س$ عامل مشترك

$2ك س(3س - 1) = 0$ ∴

إما $2ك س \neq 0$ أو $3س - 1 = 0$ ∴ $س = \frac{1}{3}$ ∴ $س = ث$

$ك > 0$ دائماً ↙

صنا إشارة $ق(س)$:



$ق(س)$ متزايد على $[ث, \infty[$ ومتناقص على $]-\infty, ث]$

• 2019 دور ثالث / عين فترات التزايد والتناقص للاقتران : $ق(س) = س^3 - 3س$ ، $س \in [-2, 2]$


الحل / $ق(س) = س^3 - 3س$ متصل على $[-2, 2]$ لأنه لـ ح

$قَ(س) = 3س^2 - 3 = 0$ ∴ $3س^2 = 3$ ∴ $\frac{3س^2}{3} = \frac{3}{3}$ ∴ $س^2 = 1$ ← $س = 1 \in]-2, 2[$

$س = -1 \in]-2, 2[$ ↙

صنا إشارة $قَ(س)$:

- $ق(س)$ متناقص على $[-1, 1]$
- $ق(س)$ متزايد على $[-2, -1] \cup [1, 2]$




أ.مي حواري

• 2020 دور أول / إذا كان $ق(س) = |س^4 - 4|$ ، $س \in [-2, 2]$ أوجد فترات التزايد والتناقص لـ $ق(س)$

الحل / $ق(س) = |س^4 - 4|$ متصل على $[-2, 2]$ فيجب مراعاة نقاط تغير صدود متصل .

$س^4 - 4 = 0$ ∴ $س^4 = 4$ ← $س = 2$ ↙ $س = -2$



$$ق(س) = \begin{cases} س^4 - 4 & ، -3 \leq س \leq -2 \\ 4 - س^4 & ، -2 \leq س \leq 2 \end{cases}$$

$$قَ(س) = \begin{cases} 4س^3 & ، -3 < س < -2 \\ -4س^3 & ، -2 < س < 2 \\ غ م & ، س = \{-3, -2, 2\} \end{cases}$$

$قَ(-2)^+ = -4 \times -2 = +8$

$قَ(-2)^- = 4 \times -2 = -8$


$قَ(-2)$ غ م

$\neq$

- $قَ(س) = 0$ ∴
- عندما $-3 < س < -2$ / $قَ(س) = 4س^3$ ∴ $س = 0 \notin]-3, -2[$
- عندما $-2 < س < 2$ / $قَ(س) = -4س^3$ ∴ $س = 0 \in]-2, 2[$.
- صنا إشارة $قَ$:

$ق(س)$ متزايد على $[-2, 0]$

$ق(س)$ متناقص $[-3, -2] \cup [0, 2]$



• 2020 دور أول/ إذا كان ق(س) كثير حدود متزايداً على ح وكان ك(س) = ٢س - س٣ أثبت أن الاقتران ل(س) = ق(س) + ك(س) ق(س) متزايد لما س ∈]-∞، ٣[

الحل/ ق(س) متزايد على ح ⇐ ق'(س) > ٠ لما س ∈ ح

ك(س) = ٢س - س٣ متصل على ح لأنه لـ ح .

ك'(س) = ٢ - ٣س٢


٠ = ٢ - ٣س٢

٠ = ٣س٢ - ٢

٠ = ٣(س٢ - ٢/٣)

٠ = ٣(س - √(٢/٣))(س + √(٢/٣))

س = ٠ أو س - √(٢/٣) = ٠ ⇐ س = √(٢/٣)


إشارة ك'
+ + + +

• 2020 دور ثالث/ إذا كان $ه(س)$ ، $ه_1(س)$ كثيري حدود معرفين في $[-٤، ٤]$ صح أن منحنى $ه(س)$ متناقص في مجاله و يقع في الربع الرابع و منحنى $ه_1(س)$ متزايد على مجاله و يقع في الربع الأعلى
أثبت أن $ل(س) = ه(س) \times ه_1(س)$ متناقص في $[-٤، ٤]$

الحل/ $ه$ ، $ه_1$ كثيري حدود متصلين على $[-٤، ٤]$.

* $ه(س)$ متناقص في $[-٤، ٤]$ $\Leftarrow$ $ه'(س) < ٠$ في $]-٤، ٤[$
* $ه(س)$ يقع في الربع الرابع $\Leftarrow$ $ه(س) < ٠$ في $[-٤، ٤]$
* $ه_1(س)$ متزايد على مجاله $\Leftarrow$ $ه_1'(س) > ٠$ على $]-٤، ٤[$
* $ه_1(س)$ يقع في الربع الأعلى $\Leftarrow$ $ه_1(س) > ٠$ في $[-٤، ٤]$
* $ل(س) = ه(س) \times ه_1(س)$ متصل على $[-٤، ٤]$ حاصل ضرب متصلين

$ل'(س) = ه'(س) ه_1(س) + ه_1'(س) ه(س)$ في $]-٤، ٤[$

$ل'(س) = (-سالب)(موجب) + (موجب)(سالب) = سالب + سالب = سالب$

بما أن $ل'(س) < ٠$ في $]-٤، ٤[$ $\Leftarrow$ $ل(س)$ متناقص في $[-٤، ٤]$ #

• 2021 دور أول/ عين مجالات التزايد والتناقص للاقتران $ه(س) = س(٣س^٤ - ٩)$ و $س \in [-٣، ٣]$

الحل/ $ه(س) = س(٣س^٤ - ٩) = ٣س^٥ - ٩س$ كثير حدود متصل على $[-٣، ٣]$

$ه'(س) = ٩س^٤ - ٩$


$ث = ٩س^٤ - ٩ \Leftarrow ٩ = ٩س^٤ \Leftarrow ١ = س^٤$

$س = ١ \in]-٣، ٣[$ ↙ ↘ $س = -١ \in]-٣، ٣[$

من اشارة $ه'(س)$

• $ه(س)$ متناقص $[-١، ١]$

وتزايد على $[-٣، -١] \cup [١، ٣]$



• 2021 دور ثاني/ عين مجالات التزايد والتناقص لـ $ه(س) = ١٢س^٣ - ٣س^٤$ و $س \in [-١، ٥]$

الحل/ $ه(س) = ١٢س^٣ - ٣س^٤$ كثير حدود متصل على $[-١، ٥]$


$ه'(س) = ٣٦س^٢ - ١٢س^٣ = ٠$

$١٢س^٢(٣ - س) = ٠$

إما $س = ٠ \Leftarrow س = ٠ \in]-١، ٥[$

أو $٣ - س = ٠ \Leftarrow س = ٣ \in]-١، ٥[$

من اشارة $ه'$:




$ه(س)$ متزايد على $[-١، ٣]$ وتناقص على $[٣، ٥] \cup [-١، -١]$

• عين فترات التزايد والتناقص لـ $ه(س) = س^٣ - ١٢س + ١٠$

الحل/ $ه(س) = س^٣ - ١٢س + ١٠$ كثير حدود متصل ومشتق على $\mathbb{R}$

$ه'(س) = ٣س^٢ - ١٢ = ٠ \Leftarrow ٣س^٢ = ١٢ \Leftarrow س^٢ = ٤ \Leftarrow س = ٢$ ↙ ↘ $س = -٢$

أ.مي حواري



ضا اشارة قـ(س) :
هـ(س) متناقص على [-٢، ٢]
هـ(س) متزايد على [٢، ∞[∪]-∞، -٢]

• 2022 دورثاني/ جد فترات التزايد والتناقص لـ هـ(س) = س(٢-س)^٣ ، س ∈ [٠، ٤]

الحل/ هـ(س) = س(٢-س)^٣ متصل على [٠، ٤] لأنه كثير حدود

قـ(س) = ٣س(٢-س)^٢ × -١ + (٢-س)^٣ × ١ (اخراج (٢-س) عامل مشترك)

= (٢-س)[-٣س + ٢-س)

= (٢-س)(٢-٤س)

إما ٢-س = ٠ ⇐ س = ٢ ∈]٠، ٤[


أو ٢-٤س = ٠ ⇐ ٤س = ٢ ⇐ س = ٢/٤ = ١/٢ ∈]٠، ٤[

أ.مي حواري

ضا اشارة قـ/

هـ(س) متزايد على [٠، ١/٢] ∪ [٢، ٤]

هـ(س) متناقص على [١/٢، ٢]



• 2022 دورثالث/ عين فترات التزايد والتناقص لمنحنى هـ(س) = س(س-٣)^٢

الحل/ هـ(س) = س(س-٣)^٢ كثير حدود متصل وقابل للاشتقاق على ح .

قـ(س) = س × ٢(س-٣) × ١ + (س-٣)^٢ اخراج (س-٣) عامل مشترك .

= (س-٣)(٢س + س-٣)


= (س-٣)(٣س-٣)

إما (س-٣) = ٠ ⇐ س = ٣ ∈ ح أو ٣س-٣ = ٠ ⇐ ٣س = ٣ ⇐ س = ١

ضا اشارة قـ/

هـ(س) متناقص على [١، ٣]

ومتزايد على]-∞، ١] ∪ [٣، ∞[



• 2023 دورأول/ عين فترات التزايد والتناقص لـ هـ(س) = س^٣ - ٢٧س + ١ ، س ∈ ح

الحل/ هـ(س) = س^٣ - ٢٧س + ١ كثير حدود متصل وقابل للاشتقاق على ح


قـ(س) = ٣س^٢ - ٢٧ = ٠

٣س^٢ = ٢٧ ⇐ س^٢ = ٩ ⇐ س = ٣ ، س = -٣

ضا اشارة قـ :

هـ(س) متزايد على]-∞، -٣] ∪ [٣، ∞[

هـ(س) متناقص على [-٣، ٣]



• 2023 دور ثاني/ جد فترات التزايد والتناقص للاقتران $ه(س) = س^3 - 3س^2 - 9س + 61$
$س \in [-1, 4]$


الحل/ $ه(س) = س^3 - 3س^2 - 9س + 1$ قابل للاشتقاق على $[-1, 4]$

$ه'(س) = 3س^2 - 6س - 9 = 0 \div 3$

$س^2 - 2س - 3 = 0 \Leftarrow (س + 1)(س - 3) = 0$

إما $س + 1 = 0 \Leftarrow س = -1 \notin]-1, 4[$

أو $س - 3 = 0 \Leftarrow س = 3 \in]-1, 4[$



ضع إشارة $ه'(س)$:

$ه(س)$ متناقص على $[-1, 3]$

ومتزايد على $[3, 4]$


• 2023 دور ثالث/ إذا كان $ه(س) = |س^2 - 4|$ على $[-1, 3]$ أوجد فترات التزايد والتناقص للاقتران $ه(س)$

الحل/ $ه(س) = |س^2 - 4|$ متصل على $[-1, 3]$ لأن قيمة مطلقة بداخله قابل متصل

* لفك تعريف $|س^2 - 4|$:

$س^2 - 4 = 0 \Leftarrow س^2 = 4 \Leftarrow س = 2$


$س = -2$



$\Leftarrow ه(س) = 4 - س^2$ على $[-1, 3]$

$ه'(س) = -2س = 0 \Leftarrow س = 0 \in]-1, 3[$

ضع إشارة $ه'$:



$ه(س)$ متزايد على $[-1, 0]$

$ه(س)$ متناقص على $[0, 3]$

أ.مي حواري

• 2023 دور ثالث/ إذا كان $ه(س)$ كثير حدود معرفاً على $[-1, 6]$ ويقع منحناه في الربع الأول ومتزايد في مجاله وكان $هـ(س) = 6 - س$ بين أن الاقتران $ل(س) = \frac{هـ(س)}{ه(س)}$ متناقصاً على $[0, 6]$


الحل/ * $ه(س)$ قابل متصل على $[-1, 6]$ ويقع منحناه في الربع الأول $\Leftarrow ه(س) > 0$ في $[0, 6]$

$ه(س)$ متزايد في مجاله $\Leftarrow ه'(س) > 0$ على $]-1, 6[$

* $هـ(س) = 6 - س$ قابل متصل وصفره عند 6.

$س = 6 \in س = 6 - س = 0$

$هـ(س) > 0$ على $[-1, 6]$



* $ك(س) = -1 < 0$ $\Leftarrow$ $ك(س) < 0$ على $]-1, 6[$

$ل(س) = \frac{هـ(س)}{ه(س)}$ متصل على $[0, 6]$ حاصل قسمة متصلين $\Leftarrow ه(س) \neq 0$

$ل'(س) = \frac{ه(س)ك(س) - هـ(س)ه'(س)}{ه^2(س)}$

$ق'(س) = \frac{(موجب)(سالب) + (موجب)(موجب)}{موجب^2} = \frac{(سالب)+(سالب)}{موجب} = سالب$

$ق'(س) < 0$ في $]0، 1[$ $\Leftarrow$ $ق(س)$ متناقصاً في $[0، 1]$ #

• 2024 دور أول / أوجد فترات التزايد والتناقص للاقتران $ق(س)$ حيث :

$ق(س) = 3$ جاس جتاس $+ \sqrt{3}$ جتا$(2س)$ $س \in [0، \pi]$

الحل / $ق(س) = 3$ جاس جتاس $= 3 \times \frac{1}{2}$ جا$(2س)$


$ق(س) = \frac{3}{2}$ جا$(2س)$ متصل على $[0، \pi]$

$ق'(س) = \frac{3}{2} \times 2$ جتا$(2س)$

$ق'(س) = 3$ جتا$(2س)$ $\Leftarrow$ $ن = 3$ جتا$(2س)$ ، لاحظ $2س \in [0، 2\pi]$

$2س = \frac{\pi}{3} \Leftarrow ن = \frac{1}{2} \in]0، 1[$ $\Leftarrow$ $س = \frac{\pi}{6} \in]0، \frac{\pi}{2}[$

$2س = \frac{5\pi}{3} \Leftarrow ن = \frac{1}{2} \in]0، 1[$ $\Leftarrow$ $س = \frac{5\pi}{6} \in]\frac{\pi}{2}، \pi[$



حل آخر لاشارة $ق'(س)$:

$ق(س)$ متناقص على $[\frac{\pi}{6}، \frac{5\pi}{6}]$

$ق(س)$ متزايد على $[0، \frac{\pi}{6}]$

$\cup$ $[\frac{5\pi}{6}، \pi]$

أ.مي حواري

• 2024 دور ثاني / عين فترات التزايد والتناقص لمنحنى $ق(س) = |س - 2|$ $س \in [0، 4]$


الحل / $ق(س) = |س - 2|$ متصل على $[0، 4]$ ؛ قيمة مطلقة لـ كثير حدود متصل .

$ق(س) = |س - 2| = \begin{cases} 2 - س & ، س < 2 \\ س - 2 & ، س \geq 2 \end{cases}$

$ق'(س) = \begin{cases} -1 & ، س < 2 \\ 1 & ، س > 2 \\ غ م & ، س = 2 \end{cases}$

$ق'(2^-) = -1$ ، $ق'(2^+) = 1$ $\Rightarrow$ $ق'(2)$ غ م .

$ق'(س) \neq 0$:



حل آخر لاشارة $ق'$:

$ق(س)$ متزايد على $[2، \infty[$

ومتناقص على $]-\infty، 2]$


• 2025 دور ثاني / اذا كان $ق(س) = \frac{1}{3}س^3 + \frac{1}{2}س^2 - 4س + 7$ جد مجالات التزايد والتناقص لـ $ق(س)$

الحل / $ق(س) = \frac{1}{3}س^3 + \frac{1}{2}س^2 - 4س + 7$ كـ 2 متصل وقابل للاشتقاق

$ق'(س) = س^2 + س - 4 = 0$ $\Leftarrow$ $ن = 1$

• تأكد/ إذا كان $د(س)$ متصلاً على $ح$ و كان $ل(س) = ق(س) + ك(س)$
وكان $ق(س) = -د(س)$ أثبت أن $ل(س)$ متزايدة.
$ل(س) \geq ك(س) + ٢ق(س) + ٣$ ومنه $ل(س) \geq ك(س) + ٣$

• تأكد/ $د(س) = س^٣ - ٣س^٢ + ٤$ متصلة على $ح$ و $س \neq ٠$ ، $٤ - ٦ = ٢$
$د(س)$ متناقصة على $]-\infty, ٠[$ ومتزايدة على $]٠, ٢[$
$د(س)$ متناقصة على $]٢, \infty[$



• تأكد/ $د(س) = س^٣ - ٣س^٢ + ٤$ متصلة على $ح$ و $س \neq ٠$ ، $٤ - ٦ = ٢$
$د(س)$ متناقصة على $]-\infty, ٠[$ ومتزايدة على $]٠, ٢[$
$د(س)$ متناقصة على $]٢, \infty[$

الحل

$$د'(س) = \frac{(س)ق'(س)د - (س)د'(س)ق}{(س)ق^٢} = \frac{(-)(+) - (-)(-)}{(-)^٢ق}$$

$$= \frac{-ل - (+)ل}{(+)ق} = (+)ل + (+)ق = (+)ل$$

$\because$ $ل(س) \in]٢, ٤[$ ، $ق(س) \in]٠, ٢[$ ، $د(س) \in]-٤, ٠[$

$\therefore$ $د'(س) < ٠$ على $]٠, ٢[$


$\therefore$ $د(س)$ متناقصة على $]٠, ٢[$

• تأكد/ $د(س) = س^٣ - ٣س^٢ + ٤$ متصلة على $ح$ و $س \neq ٠$ ، $٤ - ٦ = ٢$
$د(س)$ متناقصة على $]-\infty, ٠[$ ومتزايدة على $]٠, ٢[$
$د(س)$ متناقصة على $]٢, \infty[$

الحل

$د'(س) = ٣س^٢ - ٦س = ٣س(س - ٢) = ٠ \Leftarrow س = ٠$ أو $س = ٢$

$٠ \in]-\infty, ٠[$ ، $٢ \in]٠, ٢[$ ، $٣ \in]٢, \infty[$



$\therefore$ $د(س)$ متناقصة على $]-\infty, ٠[$ ومتزايدة على $]٠, ٢[$
ومتناقصة على $]٢, \infty[$

ل'(س) = ٣ و(س) × ه(س) + ٢ ه(س) × -و(س) = ٠
بما أن ل'(س) = ٠ ⇐ ل(س) اقتران ثابت #

أ.مي حواري

ذات الذَّنب يا صديقي..

ذاكَ الذي تعرِفه جيّدًا، تُكرّره دائمًا، تحاول تركه ألف مرّة، وتعود، ذاكَ مربط الفَرس، والحاجز بينك والفتح الذي

انتبه معي..

حين تُلغي متابعة التّافهين = تُنقذ نفسك! نعم تُنقذها وتُخرجها من بئر فارغ لا يليق بك، أُلفة الاختلاط، أجواء تافهة، متابعة يوميّات لا معنىً لها، ركض خلف اللّقطة واللّحظة وإثارة الجدل، ينقل الواحد منهم حياته وتفاصيله وزوجته وأخته وبيته حتّىٰ غرفة نومه؛ ليُريك وَهمًا ويَسقيك سُمًّا، فتدخل الصّورة عَقلك وتحرّك شهوتك، فتَلعَن حالَتك، وتسقط في وحل المقارنات!

تسحَبُك من واقعك سَحبًا، تأخذك لسَراب يحسبه الظمآن ماءً، دائرة تحيط بك، تُبعدك عن حقيقة مهمّتك، والله لو انشغَل الواحد منّا بغاية عظيمة وهدف بعيد ومسؤوليّة جادّة؛ ما تفرّغ لهذا، ولا وجَد وقتًا يُعطيه لتافهٍ

اختبار نهاية الوحدتين الأولى والثانية

أ.مي حواري

• السؤال الأول | اختر رمز الإجابة الصحيحة :

١/ أحد الاقترانات التالية قابلة للاشتقاق عند س = ٠ :

ب/ هـ(س) = |س³| ، ك ل(س) = ∛س

ج/ ل(س) = س⁴ / (س⁴ − س)

أ/ ق(س) = [س³ + ٣] ، الحل/ ق(س) = [س³ + ٣]

غير مشتقة عند نقط التصل .

ق(٠) = [٣ + ٠ × ٣] = [٣] ← عدد صحيح ← عند س = ٠ تحول ← ق(٠) عوض X

ب/ هـ(س) = |س³| = |س|³ = { س⁶ − ١٢ س² ٠ ، ٦ متصل عند 2 لأنه قيمة مطلقة لكثير حدود ✓
− س⁶ + ٦ س² ٠

ق(س) = { ٣ س⁴ + ٦ س² ٠
− ٣ س⁴ + ٦ س² ٠

ق(٠) = ٠ / ق(ث)⁺ = ٣(٠)⁴ = ٠ ، ق(ث)⁻ = −٣(٠)⁴ = ٠ ← ق(ث) موجودة

X جـ/ ل(س) = √س² = |س| متصل عند نقطة التصل (س = ٠) ولكنه غير مشتقة عندها

X د/ ل(س) = س⁴ / (س⁴ − س) المجال ℝ / أصفار المقام

س⁴ − س = ٠ ← س(س − ١) = ٠ ← إما س = ٠ أو س = ١

المجال ℝ / {١ ، ٠} ← غير معرف عند س = ٠

٢/ إذا كان هـ(١ − س) = [½ س − ١] × جتا(π/٢ س) + ٥ فإن ق(٢) = ؟

أ/ −٣ ب/ −π ج/ ٠ د/ غير ذلك

الحل/ عندما ١ − س = ٢ ← ١ − ٢ = س ← س = −١

[½ س − ١]′ | س = −١ = −½ ∉ ص ← [½ س − ١]′ | س = −١ = صفر

هـ(١ − س) = [½ س − ١] جتا(π/٢ س)

ق(١ − س) × −١ = [½ س − ١] × −π/٢ جا(π/٢ س) + جتا(π/٢ س) [½ س − ١]′ | س = −١

ق(٢) × −١ = [−½ − ١] × −π/٢ جا(−π/٢) + جتا(−π/٢) × ٠

+ ق(٢) = [−¾] × −π/٢ × + جا(π/٢)

ق(٢) = −٢ × −π/٢ × ١ = π

• ملاحظة / جا(−س) = − جا س

٣/ إذا كان المستقيم ص = ٩ س + ٣ يمس منحنى هـ(س) = ١ + ٥ س − ٣ س² فإن نقطة التماس

أ/ (٦ ، ١) ب/ (−٦ ، ١) ج/ (٦ ، −١) د/ (−٦ ، −١)

الحل/ نفرض نقطة التماس (س ، ص)

ص = ٩ س + ٣ ← ص = ٩ = ميل المماس

ق′(س) = ٥ − ٤ س = ميل المنحنى عند نقطة التماس

ميل المماس = ميل المنحنى عند نقطة التماس ← ٩ = ٥ − ٤ س

$ع = -ع س \Leftarrow س = -1$

$ه(-1) = 1+5\times(-1) - 2(-1)^2 = 1-5-2 = -6 \Leftarrow$ نقطة التماس $= (-1, -6)$

٤/ إذا كان متوسط تغير $ه(س) = س^3 + 3س$ في $[ب، ب+3]$ يساوي (-3) وكانت المماسة للثابت $ب$

ب/ -1 ، ج/ -3 ، د/ -2

الحل/ طريقة (١)/ $\frac{\Delta ه(س)}{\Delta س} = \frac{ه(ب) - ه(ب-3)}{ب - (ب-3)} = -3 \Leftarrow \frac{(ب^3 + 3ب) - ((ب-3)^3 + 3(ب-3))}{3} = -3$

$\Leftarrow \frac{ب^3 + 3ب - (ب^3 - 9ب^2 + 27ب - 27 + 3ب - 9)}{3} = -3 \Leftarrow 9ب^2 - 27ب + 27 = -9$

$\Leftarrow 9ب^2 - 27ب + 36 = 0 \Leftarrow ب^2 - 3ب + 4 = 0 \Leftarrow (ب-4)(ب+1) = 0$

$\therefore ب = -1$ أو $ب = 4$

طريقة (٢)/ نبدأ السؤال ضع دائرة:

$\frac{\Delta ه(س)}{\Delta س} = 2(س + ج) + ب \Leftarrow -3 = 2(-3 + 3) + ب \Leftarrow ب = -3$

$\Leftarrow ه(س) = س^2 - 3س + ج \Leftarrow -1 = 9 - 9 + ج \Leftarrow ج = -1$

٥/ إذا كان $ص = ظاس + قاس$ ومماسة $\frac{ص}{ص}$

ب/ $ظاس$ ، ج/ $قاس$ ، د/ $ظاس$

الحل/ $ص = ظاس قاس + قاس$ (إخراج $قاس$ عامل مشترك).

$ص = قاس(ظاس + قاس)$

$\frac{ص}{ص} = قاس \times \frac{ص}{ص}$ ، $\frac{ص}{ص} = قاس$.

أ.مي حواري


٦/ الاقتران $ه(س) = \frac{س}{لو_{ه} س}$ متزايداً على الفترة:

ب/ $[ه، \infty[$ ، ج/ $]-\infty، ه[$ ، د/ $]-\infty، ه[$

الحل/ $ه(س) = \frac{س}{لو_{ه} س}$ متصل على $س > صفر، س \neq 1$ وحاصل قسمة متصلين و $لو_{ه} س \neq 0$

$ه'(س) = \frac{لو_{ه} س \times 1 - س \times \frac{1}{س}}{(لو_{ه} س)^2}$

$= 0 \Leftarrow لو_{ه} س - 1 = 0 \Leftarrow لو_{ه} س = 1 \Leftarrow س = ه$



$س = ه \in]-\infty، ه[\cup]ه، \infty[$ / ؟!

من إشارة $ه'(س)$ / $ه(س)$ متزايداً في $[ه، \infty[$

ملاحظة/ مجال $ه(س)$: $لو_{ه} س \Leftarrow س > 0$ ولكن نبدأ الـ $(لو_{ه} س)$ في المقام

$لو_{ه} س = 0 \Leftarrow س = ه^0 \Leftarrow س = 1$ ، المجال $س > 0$ / $\{1\}$.

٧/ يتحرك جسم حسب العلاقة ف(ن) = ن^ل ، ل > ٠ ، فإذا كانت سرعة الجسم بعد (١٠) ثواني مثلي سرعته بعد (٥) ما قيمة الثابت ل

ب/ ٣ ، ج/ ٣ ، د/ ٤

٣-/P

الحل/ ف = ن^ل ⇐ ع = ف' = ل(ن)^(ل-١)

ع(١٠) = ٢ع(٥) ⇐ ل(١٠)^(ل-١) = ٢ل(٥)^(ل-١) ، ل ≠ ٠ ∴

∴ ٥^(ل-١) ≠ ٠ ، ٢ ≠ ٠ ⇐ ٥^(ل-١) = ٢ × ٥^(ل-١) ⇐ (٢ × ٥)^(ل-١) = ٢(٥)^(ل-١)

⇐ ٢^(ل-١) = ٢^١ ⇐ ل-١ = ١ ⇐ ل = ٢

٨/ إذا كان ص = لو_هـ (س^هـ / هـ^س) فإن ص' / س = ٠ عندما س = ١

ب/ ±١ ، ج/ -١ ، د/ صفر

الحل/ ص = لو_هـ س^هـ - لو_هـ هـ^س ⇐ ص = هـ س^هـ - ٢ لو_هـ س

ص' = ٢س - ٢/س = ٠ ⇐ ٢س^٢ = ٢ ⇐ س^٢ = ١ ⇐ س = ١ ، س = -١

٩/ اذا كان ف(س) = س^هـ ، ه(س) = |٣س - ٥| ما قيمة (ف × ه)'(١)

ب/ ٢-/P ، ج/ غير موجودة ، د/ ٦

الحل/ ه(س) = |٣س - ٥| = { ٣س - ٥ ، ٣س ≥ ٥ ؛ ٥ - ٣س ، ٣س < ٥ }

← س = ١ ∈]-∞ ، ٥/٣[

ه(س) = ٥ - ٣س عندما (س = ١) ⇐ ه(١) = ٥ - ٣ = ٢

ق(س) = -٣ ⇐ ق(١) = -٣

ف(س) = س^هـ ⇐ ف(١) = (١)^هـ = ١ / ف'(س) = ٣س^٢ ⇐ ف'(١) = ٣

(ف × ه)'(١) = ف(١) ق(١) + ه(١) ف'(١)

= ١ × -٣ + ٢ × ١ = -٣ + ٣ = -٢

أ.مي حواري

١٠/ إذا كان ف(س) = س + ١/س ، ه(س) = ظتاس ، جـ(س) = (ف ٥ ه)'(س)

P/ جاس^٣ قاس ، ب/ جاس قاس ، ج/ ظاس^٣ قاس ، د/ ظتاس

الحل/ ف(س) = س + ١/س

ف'(س) = ١ - ١/س^٢

ه(س) = ظتاس

ه'(س) = -قا^٢ س

(ف ٥ ه)'(س) = ف'(ه(س)) ه'(س) = ف'(ظتاس) × -قا^٢ س

= (١ - ١/ظا^٢ س) × -قا^٢ س = -قا^٢ س + ظا^٢ س = جا^٢ س / جتا^٢ س × ١/جا^٢ س

= جاس (١ - ظا^٢ س / ظا^٢ س) = جاس × ظاس × ١/ظا^٢ س = جا^٣ س / ظا^٢ س

• السؤال الثاني

١/ إذا كان متوسط تغير $ك(س) = ه^{(س+٤س)} + ب ه^{(س+١)} - ٣ب$ للفترة $[-١، صفر]$ يساوي $٣(ه-١)$
ما قيمة الثابت ب.

الحل/ $ب = ٣$ مكرر درس متوسط التغير (خارجي).

٢/ إذا كان $ق(س) = \frac{ρ}{٤}س^{٤} - ٢س^{٣} - س - ١$ وكان $\frac{ق(١+٤هـ) - ق(١)}{٣هـ} = -٣٢$ عندما $هـ \to ٠$
ما قيمة الثابت ρ

الحل/ $\frac{ق(١+٤هـ) - ق(١)}{٣هـ} = \frac{ق(١) - ق(١)}{٣هـ} = \frac{ب}{ب}$ عندما $هـ \to ٠$

باستخدام لوبيتال / $\frac{٤}{٣} ق(١+٤هـ) = \frac{٤}{٣} ق(١) = -٣٢$ عندما $هـ \to ٠$

$ق(١) = -٣٢ \times \frac{٣}{٤} = -٢٤$

$ق(س) = \frac{ρ}{٤}س^{٤} - ٢س^{٣} - س - ١$

$ق(س) = ρ س^{٣} - ٦س^{٢} - ١$

$ق(س) = ٣ρ س^{٢} - ١٢س$ ، $ق(١) = ٦ρ - ١٢$


$-٢٤ = ٦ρ - ١٢ \Leftarrow \frac{-١٢}{٦} = \frac{٦ρ}{٦} \Leftarrow ρ = -٢$

أ.مي حواري

٣/ قذف جسم رأسيًا من أرض حسب العلاقة $ف(ن) = ٥٠ن - ٥ن^{٢}$ ، $(ف)$ ارتفاعه فوق نقطة القذف، $(ن)$ الزمن بالثواني أوجد

أ/ أقصى ارتفاع وصله الجسم ب/ سرعة ارتطام الجسم بالأرض

ج/ سرعة الجسم عندما يكون قطع مسافة ١٢٠م



الحل/ أ/ $ف = ٥٠ن - ٥ن^{٢}$

$ع = ٥٠ - ١٠ن$ ، $ع = ٠ \Leftarrow ن = ٥٠ \div ١٠ = ٥$ ث

$\Leftarrow$ ن = ٥ ث وزمن الوصول لأقصى ارتفاع "

$ف(٥) = ٥٠ \times ٥ - ٥ \times ٥^{٢} = ٢٥٠ - ١٢٥ = ١٢٥$م

ب/ بما أن زمن الصعود = زمن الهبوط

$\Leftarrow$ يصل الجسم الأرض بعد ١٠ ث.

$ع(١٠) = ٥٠ - ١٠ \times ١٠ = ٥٠ - ١٠٠ = -٥٠$م/ث

ج/ المسافة المقطوعة = ٢ × أقصى ارتفاع − $ف(ن)$

$١٢٠ = ٢ \times ١٢٥ - ف(ن) \Leftarrow ف(ن) = ٢٥٠ - ١٣٠ = ١٢٠$م

$١٢٠ = ٥٠ن - ٥ن^{٢} \Leftarrow$

$ن^{٢} - ١٠ن + ٢٤ = ٠ \Leftarrow ن = \frac{١٠ \pm \sqrt{٤ - ٩٦}}{٢} = ٦ \pm ٤$

إما $ن = ٢$ ث مرفوض ، $ن = ٤$ ث الجسم هابط

أو $ن = ٦$ ث.

ع/ $(٦) = ٥٠ - ١٠ \times ٦ = ٥٠ - ٦٠ = -١٠$م/ث

• السؤال الثالث

١/ إذا كان $\theta(س) = \begin{cases} س^3 + ب س + 3 & ، س \le 2 \\ أ س + جـ & ، س > 2 \end{cases}$ ، اقترانًا قابلًا للاشتقاق عند $(س = 2)$

وكان متوسط تغير $\theta(س)$ في $[1, 5]$ يساوي (3) ما قيمة كل من الثوابت أ، ب، جـ

الحل / $\theta(س)$ مشتقة عند $س = 2$ ← $\theta(س)$ متصل عند $(س = 2)$

$\theta'(2)^+ = \theta'(2)^-$

$أ = 3 \times 2^2 + ب \times 2 + 1$

$أ = 12 + 2ب + 1$

$أ = 2ب + 13$

$\theta(2)^+ = \theta(2)^-$

نعوض

$\lim_{س \to 2^+} (أ س + جـ) = \lim_{س \to 2^-} (س^3 + ب س + 3)$

$2أ + جـ = 8 + 2ب + 3$

$2أ - ب + جـ = 11$

$2(2ب + 13) - ب + جـ = 11$

$3ب + جـ = -15$

$3(-7) + جـ = -15$

$جـ = 6$

أ. مي حواري

* $\frac{د ص}{د س} = \frac{\theta(س^3) - \theta(س^1)}{س^3 - س^1} = \frac{\theta(5) - \theta(1)}{5 - 1} = \frac{(5أ + جـ) - (1 + ب + 3)}{4} = 3$

$\Leftarrow 12 = (5أ - 1) - (4 + ب) \Leftarrow 12 = 5أ - 1 - 4 - ب \Leftarrow 12 = 5أ - ب - 5$

$\Leftarrow 17 = 5أ - ب$

بحل المعادلتين / $أ - ب = 4$ ← $5أ - ب = 17 \Leftarrow 13 = 4أ \Leftarrow أ = \frac{13}{4}$

عندما $أ = \frac{13}{4} \Leftarrow \frac{13}{4} - ب = 4 \Leftarrow ب = \frac{13}{4} - \frac{16}{4} = ب \Leftarrow ب = -\frac{3}{4}$

٢/ إذا كان $ق(س) = (س^4 - 3) \theta(س)$ ، $س \in ح$ ، ما فترات التزايد للاقتران $ق(س)$

الحل / $ق(س) = (س^4 - 3)$ $\theta(س)$ متصل ومشتق على ح ؛ لأنه حاصل ضرب متصلين

($(س^4 - 3)$ متصل لكل ح، $\theta(س)$ متصل)

$ق'(س) = (س^4 - 3) \theta'(س) + \theta(س) (4س^3) = 0$

$\theta(س) (س^4 - 3 + 4س^3) = 0$

إما $\theta(س) \neq 0$ أو $س^4 + 4س^3 - 3 = 0$

$(س - 1)(س + 3)^3 = 0$

$س = 1$ ، $س = -3$

• من إشارة $ق'$ /

• $ق(س)$ متزايد على $[-\infty, -3] \cup [1, \infty[$

	-3		1	
سلوك $ق$	↗	↘		↗
إشارة $ق'$	+ + +	− − −		+ + +

٣/ إذا كان $ه(س) = (٩-س^{٤})(٩+٣س+س^{٤})(٩-٣س+س^{٤})$ أثبت أن $ه'(س) = -٣٠س^{٤}$

الحل/ $ه(س) = (٩-س^{٤})(٩+٣س+س^{٤})(٩-٣س+س^{٤})$

$ه(س) = (٣-س)(٣+س)(٩+٣س+س^{٤})(٩-٣س+س^{٤})$

$ه(س) = (٣+س)(٩-٣س+س^{٤}) \times (٣-س)(٩+٣س+س^{٤})$

$ه(س) = (٣^{٣}+س^{٣})(٣^{٣}-س^{٣}) = (٢٧+س^{٣})(٢٧-س^{٣})$

$ه(س) = (٢٧)^{٢}-(س^{٣})^{٢} = ٧٢٩-س^{٦}$

$ه'(س) = -٦س^{٥}$

$ه'(س) = -٣٠س^{٤}$ #

• تذكر/

$س^{٢}-ص^{٢} = (س-ص)(س+ص)$

$س^{٣}-ص^{٣} = (س-ص)(س^{٢}+سص+ص^{٢})$

$س^{٣}+ص^{٣} = (س+ص)(س^{٢}-سص+ص^{٢})$

أ.مي حواري

• السؤال الرابع/

١/ إذا كان $ص = \sqrt{٤-٢س}$ ، $ع = جا(س)$ جد $\frac{دص}{دع}$ عندما $ص = ٢$ علماً بأن $س \in [\frac{\pi}{٢}, ٠]$

الحل/ $\frac{دص}{دس} = -٢$

درس السلسلة / ضع دائرة ـ خارجي "

فكر/

٢/ إذا كان $ه(١) = ٣$ ، $ه'(١) = ٢$ والشكل المرافق يمثل منحنى $ه(س)$ ، جد قيمة الثابت ب

$\lim_{س \to ١} \frac{ب ه(١) + ه(س) \times ه(٤س) - ٧}{س-١} = ٧$ اذا علمت أن

الحل/

من الشكل $(١، ١)$ تقع على $ه(س)$ ، $ه(١) = ١$

زاوية ميل المماس $= ١٨٠ - ٤٥ = ١٣٥°$

$ه'(١) = ظا ١٣٥ = -١$

$\frac{د}{دس}(ب ه(١) + ه(س) \times ه(٤س) - ٤) = ب ه'(١) + ه(س) \times ه'(٤س) \times ٤$

$\lim_{س \to ١} \frac{ب ه(١) + ه(س) \times ه(٤س) - ٤}{س-١} = ٧$ (ثابت)

$ب \times ه'(١) + ه(١) \times ه'(١) + ه(١) \times ه'(١) \times ٤ - ٤ = ٧$

$(ب \times ٢) + (١ \times ٢) + (٣ \times -١) \times ٤ - ٤ = ٧ \Leftarrow ٤ب + ٢ - ٣ - ٤ = ٧$

$٤ب - ٥ = ٧ \Leftarrow \frac{٤}{٤}ب = \frac{١٢}{٤} \Leftarrow ب = ٣$

٣/ اذا كان $ه(س) = (س-١)^{\frac{١}{٢}}$ ، $ه(س) = ظاس$ ، $س \in [٠، \frac{\pi}{٢}[$ وكان $(ه \circ ه)'(س) = ب ه(س)$ ما قيمة/ قيم الثابت ب

الحل/ $ه(س) = س-١$ ، $ه(س) = ظاس$

$ه'(س) = \frac{١}{٢\sqrt{س-١}}$ ، $ه'(س) = ٢ظاس قاس^{٢}س$

$(ه \circ ه)'(س) = ه'(ه(س)) \cdot ه'(س)$

$\Leftarrow$ ب هـ(س) = قـ(ظاس) × ٣ قاس ظاس

$\Leftarrow$ ب × قاس = $\frac{1}{٣\sqrt{\text{قاس} - 1}}$ × ٣ قاس × ظاس ، قاس $\neq$ ٠ ∴

$\Leftarrow$ ب = $\frac{1}{\text{ظاس}}$ × ظاس $\Leftarrow$ ب = $\frac{\text{ظاس}}{|\text{ظاس}|}$


• لاحظ س $\in]\frac{\pi}{2}, \pi[$
$\Leftarrow |\text{ظاس}| = -\text{ظاس}$

$\Leftarrow$ ب = $\frac{\text{ظاس}}{-\text{ظاس}}$ $\Leftarrow$ ب = -١

• السؤال الخامس

١/ الشكل المجاور يمثل منحنى قـ(س) والمماس له عند (س = -١) وكانت

نهـا $\frac{٣ قـ(س) - \sqrt[٣]{س}}{س^٤ + س}$ = $\frac{٣}{٢}\sqrt[٣]{٢}$ ، جـ = (هـ × قـ)(-١)
س $\to$ -١



الحل/

نهـا $\frac{٣ قـ(س) - \sqrt[٣]{س}}{س^٤ + س}$ = $\frac{٣ قـ(-١) + \sqrt[٣]{-١}}{(-١)^٤ - ١}$
س $\to$ -١

= $\frac{٣ قـ(-١) + \sqrt[٣]{-١}}{٠}$

بما أن المقام = ٠ / والنهاية موجودة $\Leftarrow$ البسط = ٠ $\Leftarrow$ ٣ قـ(-١) + $\sqrt[٣]{-١}$ = ٠

٣ قـ(-١) = $\sqrt[٣]{-١}$ $\Leftarrow$ قـ(-١) = $\frac{\sqrt[٣]{-١}}{٣}$ = $\frac{\sqrt[٣]{-١} \times \sqrt[٣]{-١}}{٣ \times \sqrt[٣]{-١}}$ = $\frac{\sqrt[٣]{-١}}{٣\sqrt[٣]{-١}}$ = $\frac{-١}{٣\sqrt[٣]{-١}}$

$\Leftarrow$ قـ(-١) = $\frac{-١}{٣\sqrt[٣]{-١}}$

(-١ ، هـ(-١)) ∈ ل

الميل = $\frac{\Delta ص}{\Delta س}$ = قـ(-١) $\Leftarrow$ $\frac{هـ(-١)}{-١ - ٢}$ = قـ(-١) $\Leftarrow$ هـ(-١) = -٣ × $\frac{\sqrt[٣]{-١}}{٣}$ = $\sqrt[٣]{-١}$

$\Leftarrow$ هـ(-١) = $\sqrt[٣]{-١}$

• نهـا $\frac{٣ قـ(س) - \sqrt[٣]{س}\, هـ(س)}{س^٤ + س}$ = $\frac{٣ قـ(١) - \sqrt[٣]{-١}}{١ + ٢-}$ = $\frac{٣ قـ(س) - \sqrt[٣]{-١}}{١ + ٣س}$ = $٢\sqrt[٣]{٣}$
س $\to$ ١

٣ قـ(-١) - $\sqrt[٣]{-١}$ = -$٢\sqrt[٣]{٣}$ $\Leftarrow$ ٣ قـ(-١) = -$\sqrt[٣]{٣}$ $\Leftarrow$ قـ(-١) = $\frac{-\sqrt[٣]{٣}}{٣}$ = $\frac{-١}{\sqrt[٣]{٣}}$

• المطلوب/ (هـ × قـ)'(-١) = هـ(-١) قـ'(-١) + قـ(-١) قـ(-١)

= $\sqrt[٣]{-١} \times -\frac{١}{\sqrt[٣]{-١}} + (\frac{-١}{\sqrt[٣]{-١}})^٢$ = -١ + $\frac{١}{٣}$ = $\frac{-٢}{٣}$

أ.مي حواري

١٢/ إذا كان صـ = $(\frac{١}{٢}$ ظاس جا(٢س))^٣ ، بيّن أن صـ = ٣ جأس جا(٢س)

الحل/ $\frac{١}{٢}$ ظاس جا(٢س) = $\frac{١}{٢} \times \frac{\text{جاس}}{\text{جتاس}} \times ٢$ جاس جتاس = جأس

ص = (جاس)^{3} = جا^{3}س ← ص' = ٦جا^{٥}س × جتاس

= ٣ × ٢ × جاس × جا^{٤}س × جتاس

= (٢ × جاس × جتاس) × ٣جا^{٤}س

= ٣جا^{٤}س جا(٢س) #

٣/ اذا كان ق(س) = لتر صفر معرف على [٠، ٢π] بحيث يقع منحناه في الربع الأول ومتناقصاً في مجاله

وكان ه(س) = ٨ - س بين أن الاقتران (ق ○ ه)(س) متزايداً في [٠، ٢π] .

الحل/ * ق(س) لـ C^{1} متصل على [٠، ٢π] ومشتق على]٠، ٢π[

ق(س) يقع في الربع الأول ← ق(س) > ٠ ∀ س ∈ [٠، ٢π]

ق(س) متناقصاً في مجاله ← ق'(س) < ٠ ∀ س ∈]٠، ٢π[

* ه(س) = ٨ - س ← لـ C^{1} متصل ومشتق على ح

ه'(س) = -١ < ٠ ∀ س ∈]٠، ٢π[

نفرض ل(س) = (ق ○ ه)(س) متصل لأنه تركيب اقترانان متصلة .

ل'(س) = ٣ق(ه(س)) ق'(ه(س)) ه'(س)

= (موجب) (سالب) (سالب) = موجب

بما أن/ ل'(س) > ٠ في]٠، ٢π[← ل(س) متزايداً في [٠، ٢π] #

أ.مي حواري

• السؤال السادس

١/ إذا كان ص = $\frac{١}{٢\sqrt{س}}$ + ٢√س أثبت أن ٤س^{٣}(ص')^{٢} = (س - ١)^{٢}

الحل/ ص = س$^{\frac{١}{٢}}$ + ٢√س ← ص' = $\frac{١}{٢}$ س$^{-\frac{٣}{٢}}$ + $\frac{١}{٢\sqrt{س}}$ × ٢√س

← ٠ = -٢√س ص' - س$^{-١}$ + ١ ← ٢√س ص' = ١ - $\frac{١}{س}$ ← ٢√س ص' = $\frac{س-١}{س}$

بتربيع الطرفين/ (٢√س ص')^{٢} = $\frac{(س-١)^{٢}}{س^{٢}}$

٤س(ص')^{٢} = $\frac{(س-١)^{٢}}{س^{٢}}$ ← ٤س^{٣}(ص')^{٢} = (س - ١)^{٢} #

٢/ ما قيمة نهـا$_{س \to ٠}$ ($\frac{١}{س}$ - $\frac{١}{ه^{س}-١}$) باستخدام قاعدة لوبتال

الحل/ نهـا$_{س \to ٠}$ ($\frac{١}{س}$ - $\frac{١}{ه^{س}-١}$) = نهـا$_{س \to ٠}$ $\frac{ه^{س}-١-س}{س(ه^{س}-١)}$ = $\frac{ه^{ن}-١-ن}{ن(ه^{ن}-١)}$ = $\frac{١-١}{(١-١)ن}$ = $\frac{٠}{٠}$

← توحيد مقامات

باستخدام لوبتال / نهـا $\frac{هـ^{س}-1}{س هـ^{س}+هـ^{س}-1} = \frac{هـ^{ن}-1}{هـ^{ن}-1} = \frac{1-1}{1-1} = \frac{ن}{ن}$ ، س ← ٠

لوبتال مرة ثانية / نهـا $\frac{هـ^{س}}{س هـ^{س}+هـ^{س}+هـ^{س}} = \frac{هـ^{ن}}{هـ^{ن}+هـ^{ن}} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$

٣/ جـ معادلة العمودي لمنحنى ق(س) = س٣ - ٦س الذي ميله يساوي (-٤)

الحل نفرض نقطة التماس (س١ ، ق(س١))

ق'(س) = ٣س٢ - ٦ = ميل المماس

-٤ = ٣س٢ - ٦ ← ٣س٢ = ٢ ← س٢ = $\frac{2}{3}$ ← س = ١

ق(١) = ١ - ٦ = -٥ ← (١ ، -٥) نقطة التماس .

* ميل العمودي = $\frac{-1}{\text{ميل المماس}} = \frac{1}{4}$

م = $\frac{1}{4}$ (س١ ، ص١) = (١ ، -٥)

معادلة العمودي / ص - ص١ = م(س - س١) ← ص - ٥ = $\frac{1}{4}$(س - ١)

ص + ٥ = $\frac{1}{4}$(س - ١)

أ.مي حواري

أتقنوا دراستكم يا شباب حتى نستغني عن المجرمين في
غذائنا ودوائنا ولباسنا وكل معاشنا، إفعل ذلك كله
وأنت تستحضر أنك تحافظ على انتصارات إخوانك التي
بذلوا لها دمائهم واعمل بانشراح صدر وهمة ويقين
بنصر الله لعباده المؤمنين ولو بعد حين

روابط مهمة

رابط تحميل كراسة الكامل المرتبطة بهذه الحلول

https://q.qatraedu.com/sinaae-kamel1

لا تفتح هذا الرابط ولا تمسح الباركود بالأسفل

https://q.qatraedu.com/tlqatramath