



À la maison

- Compresses stériles (5x5 cm et 10x10 cm)
- Bandes de gaze (5 cm de large)
- Désinfectant : chlorhexidine à 0,05 % ou Bétadine diluée (pas d'alcool pur)
- Sérum physiologique (flacon ou unidoses)
- Ciseaux à bouts ronds
- Pince à épiler (pour épines, tiques)
- Tire-tique (crochets O'Tom)
- Gants en latex ou nitrile
- Seringues sans aiguille (pour nettoyer les plaies)
- Thermomètre rectal digital
- Muselière adaptée à la taille de ton animal
- Couverture de survie
- Lampe torche ou frontale

Dans la voiture

- Caisse de transport (chat) ou harnais voiture (chien)
- Couverture propre
- Kit de compresses + bande de gaze
- Flacon de sérum physiologique
- Gants jetables
- Lampe torche
- Bouteille d'eau (pour refroidir en cas de coup de chaleur)
- Carnet de santé (ou photo sur téléphone)
- Liste des numéros d'urgence vétérinaire

Vérifie ta trousse chaque année et remplace ce qui est périmé ou utilisé.

À savoir utiliser

Thermomètre rectal

- Température normale : 38,0 à 39,2 °C
- Fièvre : au-dessus de 39,5 °C
- Hypothermie : en dessous de 37,5 °C
- Lubrifie légèrement avant insertion (vaseline ou eau)

Nettoyer une plaie

- Rincer abondamment au sérum physiologique Appliquer une
- compresse stérile propre
- Ne pas mettre d'alcool pur (brûle les tissus)
- Ne pas retirer un objet planté profondément planté (clou, verre)

Ce que la trousse ne remplace pas

- Un diagnostic vétérinaire
- Des médicaments adaptés
- Un traitement sur prescription

Gestes interdits

- Pas de désinfectant coloré (Mercurochrome)
- Pas de coton (laisse des fibres dans la plaie)
- Pas de bandage trop serré (arrêt de la circulation)