

## Calendario Rutinario

Edad	Vacuna	Dosis Primarias	Dosis de Refuerzo
6 meses– 4 años	<b>Pfizer</b> – Bebés/Niños Pequeños	1ra Dosis → 3-8 semanas <sup>^</sup> → 2da Dosis → ≥8 semanas → 3ra Dosis	
6 meses– 5 años	<b>Moderna</b> – Bebés/Niños Pequeños	1ra Dosis → 4-8 semanas <sup>^</sup> → 2da Dosis	
5–11 años	<b>Pfizer</b> – Pediátrico	1ra Dosis → 3-8 semanas <sup>^</sup> → 2da Dosis → ≥5 meses → Refuerzo	
6–11 años	<b>Moderna</b> – Pediátrico	1ra Dosis → 4-8 semanas <sup>^</sup> → 2da Dosis	

## Calendario si está Moderadamente o Gravemente Inmunocomprometido

Edad	Vacuna	Dosis Primarias	Dosis de Refuerzo
6 meses– 4 años	<b>Pfizer</b> – Bebés/Niños Pequeños	1ra Dosis → 3 semanas → 2da Dosis → ≥8 semanas → 3ra Dosis	
6 meses– 5 años	<b>Moderna</b> – Bebés/Niños Pequeños	1ra Dosis → 4 semanas → 2da Dosis → ≥4 semanas → 3ra Dosis	
5–11 años	<b>Pfizer</b> – Pediátrico	1ra Dosis → 3 semanas → 2da Dosis → ≥4 semanas → 3ra Dosis → ≥3 meses → Refuerzo	
6–11 años	<b>Moderna</b> – Pediátrico	1ra Dosis → 4 semanas → 2da Dosis → ≥4 semanas → 3ra Dosis	

<sup>^</sup> Un [intervalo de 8 semanas](#) puede ser preferible para algunas personas, especialmente para hombres de 12 a 39 años.

Consulte las [Consideraciones Clínicas Provisionales para el uso de Vacunas Contra el COVID-19](#) para obtener más información. El calendario esta sujeto a cambios.


## Calendario Rutinario

Edad	Vacuna	Dosis Primarias	Dosis de Refuerzo
12-17	Moderna- Adol/Adulto	<p>1ra Dosis → 4-8 semanas<sup>^</sup> → 2da Dosis</p>	
12+	Pfizer/ Adol/Adulto	<p>1ra Dosis → 3-8 semanas<sup>^</sup> → 2da Dosis</p>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; background-color: #e0f2f1;"> <p><b>1er Refuerzo</b></p> <p><b>Edades 12-17:</b> Pfizer</p> <p><b>18+:</b> Moderna/ Pfizer (ARNm preferido) o J&amp;J*</p> </div> <p style="text-align: center;">→ ≥4 months →</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; background-color: #e0f2f1;"> <p><b>2do Refuerzo</b></p> <p><b>Edades 50+:</b> Moderna/Pfizer</p> <p><b>18-49:</b> Actualmente no recomendado.</p> <p>(Si recibió J&amp;J para el refuerzo primario y el 1er refuerzo, puede considerar recibir un 2do refuerzo de la vacuna de ARNm).</p> </div>
18+	Moderna- Adol/Adulto	<p>1ra Dosis → 4-8 semanas<sup>^</sup> → 2da Dosis</p>	
18+	Janssen (J&J) Pfizer/Moderna preferido*	<p>1ra Dosis → ≥2 meses →</p>	

<sup>^</sup> Un [intervalo de 8](#) semanas puede ser preferible para algunas personas, especialmente para hombres de 12 a 39 años.

\* Aunque se prefiere el uso de vacunas mRNA COVID-19, la vacuna Janssen se puede ofrecer en [algunas situaciones](#).  
[Consulte las Consideraciones Clínicas Provisionales para el Uso de Vacunas contra el COVID-19](#) para obtener más información. El calendario esta sujeto a cambios.

## Calendario si está Moderadamente o Gravemente Inmunocomprometido

Edad	Vacuna	Dosis Primarias	Dosis de Refuerzo
12-17	Moderna- Adol/Adulto		
12+	Pfizer/ Adol/Adulto		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #e0f2f7;"> <p><b>1er Refuerzo</b> Edades 12-17: Pfizer</p> <p><b>18+:</b> Pfizer/ Moderna ARNm preferido) o J&amp;J*</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #e0f2f7;"> <p><b>2do Refuerzo</b> Edades 12-17: Pfizer</p> <p><b>18+:</b> Moderna/ Pfizer</p> </div>
18+	Moderna- Adol/Adulto		
18+	Janssen (J&J) Pfizer/Moderna preferido*		

\* Aunque se prefiere el uso de vacunas ARNm COVID-19, la vacuna Janssen se puede ofrecer en [algunas situaciones](#).

Consulte las [Consideraciones Clínicas Provisionales para el Uso de Vacunas Contra el COVID-19](#) para obtener más información. El calendario esta sujeto a cambios.